



この添付文書は本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

こ ぎく じ おう がん  
中薬 杞菊地黄丸

(漢方製剤)

第2類医薬品

### ■特徴

中薬杞菊地黄丸は、「口が渴いて疲れやすい」、「顔と手足だけがほてる」、「尿が出にくい」、「頻尿」などの年齢と共に現れる症状のある方の「目の疲れ」や「かすんで見えにくい」といった目の症状の回復を促します。

- 生薬粉末を生かしたお薬です。
- お薬の味が広がらない飲みやすい大きさの丸剤です。



### 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人
  - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### \* ■効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすく胃腸障害がなく、尿量減少又は多尿で、ときに手足のほてりや口渴があるものの次の諸症：かすみ目、つかれ目、のぼせ、頭重、めまい、排尿困難、頻尿、むくみ、視力低下

(裏面に続く)

## ■用法・用量

次の量を食前又は食間に、水又はお湯で服用してください。  
(食間とは、食後2～3時間を指します。)

年 齢	1回の服用量	1日の服用回数
大人(15才以上)	8丸	3回
15才未満	服用しないでください	

[用法・用量に関連する注意]

用法・用量を厳守してください。

## ■成分・分量

本品24丸は

クコシ	300mg	サンヤク	600mg
キクカ	300mg	ブクリョウ	450mg
ジオウ	1,200mg	ボタンピ	450mg
サンシュユ	600mg	タクシャ	450mg

を含有する丸剤です。添加物として安息香酸ナトリウム、ハチミツ、タルク、トウモロコシデンプン、サラシミツロウを含有します。

## ■保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 本剤は、時により丸剤と丸剤が付着して塊状となることがありますので、ご使用の時、ビンを軽く振るか、スプーンなどでほぐしてから用いてください。なお、薬効には変わりありませんので、安心して服用してください。
- (5) ビンの中のものつめ物は、輸送中に丸剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

### ◎お問合せ先

イスクラ産業株式会社 お客様相談室  
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-14-2  
電 話：03-3281-3363  
受付時間：午前9:00から午後5:00まで  
(土、日、祝日を除く)

発 売 元

**イスクラ産業株式会社**

東京都中央区日本橋1-14-2

製造販売元

**松浦薬業株式会社**

名古屋市緑区大高町寅新田36