

りょうか んきょう み しん げ にんとう

苓甘姜味辛夏仁湯エキス[細粒]62

本方は「金匱要略」に収載されている処方で、体力が低下し、冷え症や貧血傾向があり、咳や喘鳴を伴う人の気管支炎や気管支喘息に奏効します。



●使用上の注意●



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること。

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3)高齢者
- (4)今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (5)次の症状のある人 むくみ
- (6)次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること。

- (1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2)1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること。

●成分・分量●

本品3包(7.5g)又は7.5gは

ブクリョウ	4.0g	ショウキョウ	2.0g
ハンゲ	4.0g	サイシン	2.0g
キョウニン	4.0g	ゴミシ	2.0g
カンゾウ	2.0g		

苓甘姜味辛夏仁湯水製エキス4.3gを含有する細粒剤です。添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、乳糖、トウモロコシデンプンを含有します。

●効能・効果●

貧血、冷え症で虚弱な人の次の諸症；
気管支炎、気管支ぜんそく

●用法・用量●

次の量を1日3回、食間に服用してください。
(食間とは食後2～3時間を指します。)

年 齢	1 回 量	
	分包剤	大入り剤
大人(15才以上)	1 包	2.5 g
15才未満7才以上	1/2包	1.2 g
7才未満4才以上	1/4包	0.6 g
4才未満	服用しないこと	

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

●保管及び取扱い上の注意●

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わるため。)
- (4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありません。
- (5)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。

●お問い合わせ先●

松浦漢方株式会社 薬事学術部

TEL (052)883-5131 受付時間 10:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

発 売 元

松浦漢方株式会社
名古屋市昭和区円上町24-21

製造販売元

 **松浦漢方株式会社**
名古屋市緑区大高町寅新田36