

さいこそかんとう

## 柴胡疏肝湯エキス〔細粒〕27

本品は、現代の複雑化した社会で、ストレスなどが原因の情緒不安定や、イライラから起こる腹痛や胸・脇痛などに奏効します。気の滞りを改善する代表処方である四逆散に川芎、青皮及び香附子を加え、気を巡らす働きが更に強化されています。



### ●使用上の注意●



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

**次の人は服用しないでください。**

生後3ヵ月未満の乳児



#### 相談すること

**1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
- (4)高齢者
- (5)次の症状のある人      むくみ
- (6)次の診断を受けた人      高血圧、心臓病、腎臓病

**2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

| 関係部位 | 症 状               |
|------|-------------------|
| 消化器  | 吐き気、食欲不振、胃部不快感、腹痛 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称           | 症 状                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

**3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

下痢

**4. 1ヵ月位（腹痛に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

**5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

## ●効能・効果●

体力中等度で、胸腹部に重苦しさがあり、ときに頭痛や肩背がこわばるものの次の諸症：

腹痛、側胸部痛、神経痛

## ●用法・用量●

次の量を食前又は食間に水又は温湯で服用してください。  
(食間とは食後2～3時間を指します。)

| 年 齢       | 1 回 量 |         | 1日服用回数 |
|-----------|-------|---------|--------|
|           | 分包剤   | 大入り剤    |        |
| 成人(15歳以上) | 1 包   | 2.0 g   | 3 回    |
| 15歳未満7歳以上 | 2/3包  | 1.3 g   |        |
| 7歳未満4歳以上  | 1/2包  | 1.0 g   |        |
| 4歳未満2歳以上  | 1/3包  | 0.7 g   |        |
| 2歳未満      | 1/4包  | 0.5 g以下 |        |

### 〔用法・用量に関連する注意〕

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

## ●成分・分量●

本品3包(6.0 g)又は6.0 gは

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| サイコ……………3 g     | コウブシ ……2.25 g  |
| シャクヤク……………3 g   | センキュウ ……2.25 g |
| キジツ ……………2.25 g | セイヒ ……………1.5 g |
| カンゾウ……………1.5 g  |                |

上記より製した柴胡疏肝湯エキス6.9 g(乾燥物換算で約2.8 gに相当)を含有する細粒剤です。添加物として乳糖、トウモロコシデンプン、デキストリン、軽質無水ケイ酸、香料を含有します。

## ●保管及び取扱い上の注意●

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありません。
- (5)分包剤で1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

## ●お問い合わせ先●

松浦漢方株式会社 薬事学術部

TEL (052)883-5131 受付時間 10:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

発 売 元

**松浦漢方株式会社**  
名古屋市昭和区円上町24-21

製造販売元

 **松浦薬業株式会社**  
名古屋市緑区大高町寅新田36