

【使用上の注意】

相関すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製剤を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐、口内炎

2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増悪が見られた場合には、服用を中止し、この製剤を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。数便、下痢
3.1ヵ月ほど服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製剤を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【成分・分量】1日量(90mL)中

フルスルチアミン塩酸塩……………30mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム…6mg
ピリドキシン塩酸塩……………30mg
ニコチン酸アミド……………45mg
加工大蒜……………150mg

ビタミンB₁₂により尿が黄色になることがあります。
添加物:白糖、ブドウ糖、ハチミツ、クエン酸水溶液、塩化ナトリウム、グルタミン酸Na、メタリン酸Na、ポリリン酸Na、リン酸二水素Na、安息香酸Na、香料

【効能・効果】

●次の諸症状の緩和:神経痛、筋肉痛、関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、便秘、眼精疲労

●悪気

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使



レイヨ-V

神経痛・筋肉痛・関節痛・手足のしびれ

眼精疲労・腰痛
肩こり・五十肩
の緩和に

30mL

第3類
医薬品

製造販売元

松田薬品工業株式会社

本社:工場 愛知県松山市河野中須賀215

電話 (089) 994-1333

制作所:神奈川県川崎市 電話 0120-149-931

用しても改善が見られない場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください」

●次の場合のビタミンB₁の補給:肉体的疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

【用法・用量】

成人(15歳以上)1日3回、1回1本(30mL)を服用してください。用法及び用量を守ってください。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
- (4)使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。

ガラス:瓶 金属:キャップ

使用期限

製造番号

