

浸煎薬

ネオ腎仙湯

第2類医薬品


☆ネオ腎仙湯は、利尿作用のほか、抗炎症作用を有する生薬を配合しており、腎臓の老廃物排泄を促進するとともに、排泄障害や炎症性の疾患にも効果を発揮します。



相談すること

* 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 胃腸の弱い人
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (5) 次の症状のある人
食欲不振、吐き気・嘔吐



* 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、吐き気・嘔吐

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

* 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

* 4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

* * 5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

腎炎、膀胱炎、尿道炎、ムクミ、尿利減少

用法・用量

- 通常成人 1 袋に水約600mlを加え約1/2量に煎じ詰め、1回約100ml・1日3回・食前又は食間に分けて服用してください。
- 通常成人1袋を3回・熱湯約150ml中にて振り出し、1日3回・食前又は食間に分けて服用してください。
- 8歳～15歳は成人の1/2量、4歳～7歳は成人の1/3量宛服用してください。

服用時間を守りましょう。

食前：食事の30分～1時間前の空腹時を指します。
食間：食後2～3時間後の空腹時を指します。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

1袋(成人1日量)中に次の生薬を20.0g含有しています。

成分	分量	成分	分量
タクシャ	1.2g	ボウイ	1.2g
チョレイ	1.2g	キササゲ	1.6g
ブクリョウ	1.6g	ウフウルシ	2.0g
ソウジュツ	1.4g	シャゼンシ	1.2g
ケイヒ	1.2g	ポウコン	1.2g
サンシシ	1.0g	インチンコウ	1.0g
シャクヤク	1.4g	ニフトコ	1.6g
ジオウ	1.2g		

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)箱の「開封年月日」記入欄に、チャック付袋を開封した日付を記入してください。
- (5)一度開封した後は、品質保持の点からなるべく早く服用してください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



煎じ方のポイント (生薬が袋の中に入っています。袋のまま使用します。)

1. 煎出容器

煎じる容器はドビン、セトモノ、耐熱ガラス製、アルマイト製、ステンレス製のものを使用してください。ただし、鉄製の容器を使うと化学反応を起こし、薬効を減少させることがありますので使用しないでください。

2. 煎出法

(1)煎剤の作り方

容器に約600mlの水と1袋を入れて火にかけ、とろ火で沸騰させます。沸騰したら蓋を取り、吹きこぼれないように弱火に調節して30～40分間煎じ、約1/2量に煮詰めてください。できた薬液から袋を取り出したものが1日分です。その薬液を3回に分けて服用してください。




●注意

煎剤は、1日分(1袋)ずつを煎じてください。煎じた薬液は変質しやすいので冷蔵庫に保存し、煎じたその日のうちに服用してしまうのが原則です。そして服用時には、1回に服用する分だけを温め直してから服用してください。

(2)浸剤(振り出し剤)の作り方

1日に同じ1袋を用いて3回下記の方法で作ります。

1袋を容器に入れ、熱湯約150mlを注いでかき混ぜながら5分間ほど浸してください。できた薬液から袋を取り出し、その薬液を1回分として服用してください。



1日1袋で3回、くり返し使用

●注意

浸剤(振り出し剤)は、1回分ずつ作ってください。2～3回分をまとめて一度に作らないでください。一度使用した袋は中身の生薬が変質しやすいので、冷蔵庫に保存してください。

お問い合わせ先

本製品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡お願い申し上げます。

摩耶堂製薬株式会社 「くすりの相談室」
〒651-2142 神戸市西区二ツ屋1-2-15 電話 (078)929-0112
受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日、弊社休日を除く)



製造販売元

摩耶堂製薬株式会社
神戸市西区玉津町居住65-1