

カップで
簡単!

マヤドーの煎じ薬



① 熱湯100mLに
ティーバッグを入れ



② かき混ぜながら
しばらく待てば...



③ 1回分の出来あがり!
※ティーバッグは
1日以内に3回使えます

【効能効果】 神経痛、リウマチ、関節炎、筋肉痛、
腰痛、背痛、五十肩

ネオ雲仙湯

腰痛・背中痛・
五十肩・神経痛に

✓冷えるとあちこち痛み出す
✓湿布がいつも手放せない



和漢のチカラを科学し、あなたへ



茶剤・1袋

第②類医薬品
HR242E-01

この説明書は本剤と
ともに保管し、服用の際
にはよくお読みください。

茶剤 ネオ雲仙湯

第②類医薬品

生薬製剤 20.0g×1袋

⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
授乳中の人には本剤を服用しないが、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

👤 **相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 胃腸の弱い人、胃腸が弱く下痢しやすい人 (5) 発汗傾向の著しい人 (6) 高齢者 (7) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (8) 次の症状のある人: むくみ、食欲不振、吐き気、嘔吐、軟便、下痢、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人: 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、腎臓病 (10) 次の医薬品を服用している人: 瀉下薬 (下剤)
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、吐き気・嘔吐、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
精 神 神 経 系	不眠、発汗過多、頻脈、動悸、全身脱力感、精神興奮
泌 尿 器	排尿障害

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、 脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 軟便、下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】 神経痛、リウマチ、関節炎、筋肉痛、腰痛、背痛、五十肩

【用法・用量】 ○成人 1日1袋を3回・熱湯約100ml中にて振り出し、食前又は食間に温服してください。○成人 1日1袋に水約500mlを加え約1/2量に煎じ詰め、食前又は食間の3回に分けて温服してください。○小児は成人の約1/2量宛服用してください。

<用法・用量に関連する注意> (1) 用法・用量を厳守してください。(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】 1袋(成人1日量)中に次の生薬を20.0g含有しています。

カンゾウ1.0g/ノウジュツ1.0g/ケイヒ1.2g/マオウ2.0g/ショウキョウ1.0g/タイソウ1.0g/キョウニン1.0g/ボウイ1.6g/ボウフウ1.0g/シャクヤク1.6g/カッコン2.0g/ブクリョウ1.2g/ボタンビ1.2g/トウニン1.0g/ダイオウ1.0g/ヨクイニン1.2g

【保管及び取扱い上の注意】 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(4) 一度開封した後は、品質保持のため、なるべく早く服用してください。(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



製造販売元 ロート製薬グループ
摩耶堂製薬株式会社
神戸市西区玉津町居住65-1

お問合せ先: 「くすりの相談室」 電話(078)929-0112
受付時間: 9時から17時30分まで(土、日、祝日、弊社休日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先 0120-149-931



使用
期限
製造
番号

HR242F-01