

浸煎薬

ネオ快気湯

医薬品

☆ネオ快気湯は、鎮咳作用を有する生薬を主体に17種類の生薬を配合した浸煎剤で、喘息などで繰り返す咳、痰などを鎮め、呼吸を楽にします。
また、喘息など起こしやすい体質の改善にも役立ちます。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
 - (4) 胃腸の弱い人
 - (5) 発汗傾向の著しい人
 - (6) 高齢者
 - (7) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (8) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (9) 次の症状のある人
 - むくみ、食欲不振、悪心・嘔吐、排尿困難
 - (10) 次の診断を受けた人
 - 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、腎臓病
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。



(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、悪心・嘔吐
精神神経系	不眠、発汗過多、頻脈、動悸、全身脱力感、精神興奮
泌 尿 器	排尿障害

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合

- 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください。

効能・効果

咳・気管炎・喘息・喘鳴・痰・体質改善

用法・用量

- 通常成人 1 袋を 3 回、熱湯約 150ml ずつで振り出し、1 日 3 回食前又は食間に服用してください。
- 成人 1 袋に水約 600ml をを加え約 1/2 量に煎じ詰め、1 回約 100ml、1 日 3 回食前又は食間に温服することもあります。
- 8 歳～15 歳は成人の 1/2 量、4 歳～7 歳は成人の 1/3 量宛服用してください。

服用時間を守りましょう。

食前：食事の 30 分～1 時間前の空腹時を指します。
食間：食後 2～3 時間後の空腹時を指します。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量、保管及び取扱上の注意、お問い合わせ先については、裏面をよくご覧ください。

成分・分量

1袋(成人1日量)中に次の生薬を20.0g含有しています。

成分	分量	成分	分量	成分	分量
マオウ	3.0g	ゴミシ	1.0g	オウゴン	1.0g
ショウキョウ	0.8g	ハンゲ	1.0g	タイソウ	0.8g
シャクヤク	1.4g	キョウニン	1.0g	キキョウ	1.2g
カンゾウ	1.0g	ブクリョウ	1.0g	オンジ	1.2g
ケイヒ	1.4g	コウボク	1.2g	モッカ	1.2g
サイシン	0.8g	サイコ	1.0g		

<成分・分量に関連する注意>

本剤の服用により、糖尿病の検査値に影響を及ぼすことがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 箱の「開封年月日」記入欄に、チャック付袋を開封した日付を記入してください。
- (5) 一度開封した後は、品質保持の点からなるべく早く服用してください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



煎じ方のポイント (生薬が袋の中に入っています。袋のまま使用します。)

1. 煎出容器

煎じる容器はドビン、セトモノ、耐熱ガラス製、アルマイト製、ステンレス製のものを使用してください。ただし、鉄製の容器を使うと化学反応を起こし、薬効を減少させることがありますので使用しないでください。

2. 煎出法

(1) 煎剤の作り方

容器に約600mlの水と1袋を入れて火にかけ、とろ火で沸騰させます。沸騰したら蓋を取り、吹きこぼれないように弱火に調節して30～40分間煎じ、約1/2量に煮詰めてください。できた薬液から袋を取り出したものが1日分です。その薬液を3回に分けて服用してください。



●注意

煎剤は、1日分(1袋)ずつを煎じてください。煎じた薬液は変質しやすいので冷蔵庫に保存し、煎じたその日のうちに服用してしまうのが原則です。そして服用時には、1回に服用する分だけを温め直してから服用してください。

(2) 浸剤(振り出し剤)の作り方

1日に同じ1袋を用いて3回下記の方法で作ります。

1袋を容器に入れ、熱湯約150mlを注いでかき混ぜながら5分間ほど浸してください。できた薬液から袋を取り出し、その薬液を1回分として服用してください。



●注意

浸剤(振り出し剤)は、1回分ずつ作ってください。2～3回分をまとめて一度に作らないでください。一度使用した袋は中身の生薬が変質しやすいので、冷蔵庫に保存してください。

1日1袋で3回、くり返し使用

お問い合わせ先

本製品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡お願い申し上げます。

摩耶堂製薬株式会社 「くすりの相談室」
〒651-2145 神戸市西区玉津町居住65-1 電話 (078)929-0120
受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)



摩耶堂製薬株式会社
神戸市西区玉津町居住65-1