

皮膚病用内服薬

ネオ小町錠

第2類医薬品

☆ネオ小町錠は、ニキビ、吹出物、肌荒れなどお肌のトラブルの改善に効果を発揮するとともに、お肌によいビタミン類(ビタミンB₂やビタミンB₆、ビタミンC等)を配合していますので、肌荒れを防止し、お肌の不調を整えます。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。
5歳未満の乳児・幼児
(錠剤がのどにつかえることがあります。)
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。



相談すること

＊＊1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
- (4) 胃腸の弱い人、胃腸が弱く下痢しやすい人
- (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (6) 次の症状のある人
食欲不振、吐き気・嘔吐、軟便、下痢
- (7) 次の医薬品を服用している人
瀉下薬(下剤)



＊＊2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、吐き気・嘔吐、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

＊＊3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
便秘、軟便、下痢

＊＊4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

ニキビ、吹出物、シミ、ソバカス、色素異状沈着、ジン麻疹、湿疹、皮ひ炎、痒疹、アセモ、皮ひ掻痒症、口唇炎、口唇キ裂、アレルギー体質、シモヤケ、アカギレ等の治療と予防

用法・用量

通常 1回3～5錠・1日2～3回、水又はお湯で服用してください。

なお、年齢・症状に応じ適宜増減してください。

<用法・用量に関連する注意>

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

10錠中に次の成分を含有しています。

成 分	分 量	成 分	分 量
キキョウ	200.0mg	サンキライ	200.0mg
センキュウ	200.0mg	ニンドウ	150.0mg
ダイオウ	250.0mg	ニコチン酸アミド	100.0mg
オウゴン	200.0mg	リボフラビン(ビタミンB ₂)	5.0mg
トウキ	150.0mg	ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	20.0mg
ボタンピ	200.0mg	アスコルビン酸(ビタミンC)	200.0mg
ヨクイニン	300.0mg	DL-メチオニン	80.0mg
ケイヒ	150.0mg	パントテン酸カルシウム	25.0mg
ケイガイ	150.0mg	乳酸カルシウム水和物	340.0mg
レンギョウ	150.0mg		

添加物としてマクロゴール、ゼラチン、タルク、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Mg、銅クロロフィリンNa、アラビアゴム、白糖、セラック、ヒプロメロース、乳糖、セルロース、炭酸Ca、カルナウバロウを含有します。

<成分・分量に関連する注意>

(1)本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、リボフラビン(ビタミンB₂)によるものですから心配ありません。

* (2)ビタミンCを含有する製剤は、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。従って、医師の検査を受ける場合は、本剤を服用していることを医師にお知らせください。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に

密栓して保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。

(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

(4)ビンのフタはよくしめてください。しめ方が不十分ですと湿気などのため変質することがあります。また、本剤をぬれた手で扱わないでください。

(5)ビンの中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。

開封後は不要となりますので取り除いてください。

(6)箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。

(7)一度開封した後は、品質保持の点からなるべく早く服用してください。

(8)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



その他

本剤の緑色は葉緑素(銅クロロフィリンナトリウム)でタール色素は含んでいません。

お問い合わせ先

株式会社メディカルリーチ「お客様相談窓口」

〒212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町 1-2-7 戸村ビル 2 階西側

電話：0120-203-438 受付時間：10:00～18:00(土・日・祝日を除く)

発売元

株式会社メディカルリーチ
神奈川県川崎市幸区南幸町 1-2-7



製造販売元

摩耶堂製薬株式会社
神戸市西区玉津町 居住 65-1