

76.9~81.4vol% エタノール含浸綿

第3類医薬品

火気注意

サニコット

MEI

4cm×4cm 100枚

※使用に際しては、裏面の説明書をよく読んでください。

【注意】

- 次の部位には使用しないこと。
 - (1) 損傷のある皮膚。
 - (2) 目のまわり、粘膜等。
- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。

製造販売元
オリオン薬品工業株式会社
愛媛県大洲市徳森1349番地1
お客様相談室 TEL 0893(25)5134
受付時間 9:00~12:00・13:00~17:00(土日・祝日は除く)
副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造
番号

使用
期限

販売名	サニコットMEI
成分 (1パック中)	日局エタノール 86.1mL 日局イソプロパノール 3.8mL 医療脱脂綿(4cm×4cm,100枚) 19.2g(76.9~81.4vol% エタノール103.8mLを含む)
効能・効果	手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒
用法・用量	そのまま塗擦、清浄用として用いる。

開封前に、一度だけ容器を逆さまにし脱脂綿部分を軽く押すと、薬液が脱脂綿全体に含浸されます。その後、中フタをはがしてご使用ください。



開封日

年 月 日



MADE IN JAPAN

【使用上の注意】

【してはいけないこと】

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと
- (1) 損傷のある皮膚。
 - (2) 目のまわり、粘膜等。

【相談すること】

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書並びに本製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

【その他の注意】

本剤の使用によりアレルギーテストの検査に影響を及ぼすことがある。

【用法・用量】

そのまま塗擦、清浄用として用いる。

【用法及び用量に関連する注意】

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 目に入らないように注意すること。
万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。

なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。

- (3) 外用にのみ使用すること。
- (4) 過度に使用すると、脱脂綿による皮膚荒れを起こすことがある。
- (5) 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
- (6) アルコール分がタンパク質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、医療器具を清拭する際は血清膿汁等を十分に洗い落としてから使用すること。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わることがある)
- (4) 火気に近づけないこと。
- (5) アルコール又は他の薬剤を注入して使用しないこと。また、脱脂綿を継ぎ足して使用しないこと。
- (6) 開封後はすみやかに使用すること。
- (7) 使用後はトイレに流さないで、衛生的に処理すること。

脱脂綿の表面や内部に黒や黄色の小さな斑点状のものがみられることがありますが、これは綿花の果皮や種子の一部ですので、安心してお使いください。



容 器:PP
フィルム:PP,PET
外 装:PE,PET



紙 ラベル

alwety®

エタノール
76.9~81.4%
含浸

アルウエッティ Box
MEI100

アルコール含浸綿

品番 34610

第3類医薬品

火気注意

100枚入
4cm×4cm

※必ず裏面の注意事項をよく読んでから使用してください。

開封前に、一度だけ容器を逆さまにし脱脂綿部分を軽く押すと、薬液が脱脂綿全体に含浸されます。その後、中フタをはがしてご使用ください。

△
注意

1. 次の部位には使用しないこと。
(1) 損傷のある皮膚。(2) 目のまわり、粘膜等。
2. 使用が適さない場合があるので、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
3. 直射日光の当たらない涼しいところに保管すること。

JANコード

日本製



GS1-128



開封日時

月 日 時 分

販売名	サニコットMEI
成分 (1パック中)	日局エタノール 86.1mL 日局イソプロパノール 3.8mL 医療脱脂綿 19.2g (76.9~81.4vol%エタノール103.8mLを含む)
効能・効果	手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒
用法・用量	そのまま塗擦、清浄用として用いる。

製造販売元
オリオン薬品工業株式会社
愛媛県大洲市徳森1349番地1

販売元

Osaki
オオサキメディカル株式会社

名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
ホームページ <http://www.osakimedical.co.jp/>

お客様相談室 ☎ 0120-15-0039
(受付時間 10:00~17:00※土・日、祝祭日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造番号

使用期限

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

- (1) 損傷のある皮膚。
- (2) 目のまわり、粘膜等。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書並びに本製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

その他の注意

本剤の使用によりアレルギーテストの検査に影響を及ぼすことがある

【用法・用量】

そのまま塗擦、清浄用として用いる。

(用法・用量に関連する注意)

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
2. 目に入らないように注意すること。
万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。

3. 外用にのみ使用すること。

4. 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがある。

5. 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。

6. アルコール分がタンパク質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、医療器具を清拭する際は血清膿汁等を十分に洗い落としてから使用すること。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。

2. 小児の手の届かない所に保管すること。

3. 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わることがある)

4. 火気に近づけないこと。

5. アルコール又は他の薬剤を注入して使用しないこと。また、脱脂綿を継ぎ足して使用しないこと。

6. 開封後はすみやかに使用すること。

7. 使用後はトイレに流さないで、衛生的に処理すること。

8. 脱脂綿の表面あるいは内部に小さな斑点(黒及び黄色)が見られることがあるが、これは綿花の葉や種の一部であるため使用上の問題はない。



容器
フィルム
外装



紙
ラベル

01 W125×H70×D120

alwety®

エタノール
76.9~81.4%
含浸

アルウエッティ Box
MEI200

アルコール含浸綿

品番 34611

第3類医薬品

火気注意

200枚入
4cm×4cm

※必ず裏面の注意事項をよく読んでから使用してください。

開封前に、一度だけ容器を逆さまにし脱脂綿部分を軽く押すと、薬液が脱脂綿全体に含浸されます。その後、中フタをはがしてご使用ください。

注意

1. 次の部位には使用しないこと。
(1) 損傷のある皮膚。(2) 目のまわり、粘膜等。
2. 使用が適さない場合があるので、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
3. 直射日光の当たらない涼しいところに保管すること。

開封日時

月 日 時 分

販売名	サニコットMEI
成分 (1パック中)	日局エタノール 172.3mL 日局イソプロパノール 7.7mL 医療脱脂綿 38.4g (76.9~81.4vol%エタノール207.6mLを含む)
効能・効果	手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒
用法・用量	そのまま塗擦、清浄用として用いる。

製造番号

使用期限

JANコード



GS1-128



(01) 0 4971032 34611 3

製造販売元
オリオン薬品工業株式会社
愛媛県大洲市徳森1349番地1
販売元

Osaki
オオサキメディカル株式会社

名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
ホームページ <http://www.osakimedical.co.jp/>

お客様相談室 ☎ 0120-15-0039
(受付時間 10:00~17:00※土・日、祝祭日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

【使用上の注意】

してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと
(1) 損傷のある皮膚。
(2) 目のまわり、粘膜等。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書並びに本製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

その他の注意

本剤の使用によりアレルギーテストの検査に影響を及ぼすことがある

【用法・用量】

そのまま塗擦、清浄用として用いる。
(用法・用量に関連する注意)

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
2. 目に入らないように注意すること。
万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。

3. 外用にのみ使用すること。
4. 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがある。
5. 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
6. アルコール分がタンパク質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、医療器具を清拭する際は血清膿汁等を十分に洗い落としてから使用すること。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わることがある)
4. 火気に近づけないこと。
5. アルコール又は他の薬剤を注入して使用しないこと。また、脱脂綿を継ぎ足して使用しないこと。
6. 開封後はすみやかに使用すること。
7. 使用後はトイレに流さないで、衛生的に処理すること。
8. 脱脂綿の表面あるいは内部に小さな斑点(黒及び黄色)が見られることがあるが、これは綿花の葉や種の一部であるため使用上の問題はない。



容器
フィルム
外装



ラベル

01 W125×H70×D120

第3類医薬品

火気注意

76.9~81.4vol%エタノール含浸綿

サニコット
II

4cm×4cm
2枚入

MEI

200包

※使用に際しては、この説明書をよく読んでください。また、ご使用中は保管してください。

【使用上の注意】

してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと
(1) 損傷のある皮膚。
(2) 目のまわり、粘膜等。

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書並びに本製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

その他の注意

- 本剤の使用によりアレルギーテストの検査に影響を及ぼすことがある。
【用法・用量】そのまま塗擦、清浄用として用いる。
【用法及び用量に関する注意】
(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
(2) 目に入らないように注意すること。
万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
(3) 外用にのみ使用すること。
(4) 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがある。
(5) 広範囲又は長時間使用する場合、蒸気の吸入に注意すること。
(6) アルコール分がタンパク質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、医療器具を清拭する際は血清膿汁等を十分に洗い落とししてから使用すること。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わることがある)
- 火気に近づけないこと。
- アルコール又は他の薬剤を注入して使用しないこと。また、脱脂綿を縦ぎ足して使用しないこと。
- 開封後はすみやかに使用すること。
- 使用後はトイレに流さないで、衛生的に処理すること。

脱脂綿の表面や内部に黒や黄色の小さな斑点状のものがみられることがありますが、これは綿花の果皮や種子の一部ですので、安心してお使いください。

販 売 名	サニコット MEI
成 分	日局エタノール 1.4mL 日局イソプロパノール 0.06mL (1包中) 医療脱脂綿(4cm×4cm、2枚) 0.32g (76.9~81.4vol%エタノール1.7mLを含む)
効能・効果	手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒
用法・用量	そのまま塗擦、清浄用として用いる。

製造販売元 **オリオン薬品工業株式会社**
愛媛県大洲市徳森1349番地1
お客様相談室 TEL 0893(25)5134
受付時間 9:00~12:00・13:00~17:00(土日・祝日は除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)



梱包装: PE, M 箱

第3類医薬品

MADE IN JAPAN