

この説明文書は、本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

第②類医薬品

ヒヤこどもかぜシロップS

総合かぜ薬

ヒヤこどもかぜシロップSは、発熱やのどの痛みなどのかぜの諸症状を緩和する総合かぜ薬です。3か月以上7才未満のお子さま用に開発されたシロップ剤で、以下のような特長があります。

- ・ノンシュガー(キシリトール使用)
- ・ノンカフェイン
- ・のみやすいイチゴ味
- ・無着色
- ・安全キャップ採用

お子さまのかぜはこじらすとよくありませんので、早めの手当てが必要です。また、いつもより水分が失われますので、適切な水分の補給を心がけ、部屋の乾燥や、汗ばんだ下着は取りかえるなどの環境面にも気をつけてあげましょう。

使用上の注意 本剤は小児用ですが、かぜ薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。

- (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)本剤または他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳たん薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)。

3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください。(眠気があらわれることがあります。)

4. 服用時は飲酒しないでください。

5. 長期運用しないでください。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください。

- (1)医師または歯科医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3)授乳中の人。
- (4)高齢者。
- (5)本人または家族がアレルギー体質の人。
- (6)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (7)次の症状のある人。………高熱、排尿困難
- (8)次の診断を受けた人。………甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師または薬剤師に相談してください。

(1)服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	めまい
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振	その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック(アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(ステvens・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、 口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。 (これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の 症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。)
ぜんそく	

(2)5～6回服用しても症状がよくなりません。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強がみられた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。………口のかわき

(裏面も必ずお読みください。)

ヒヤこどもかぜシロップS

効能・効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

成分・分量 (48mL中)

成 分	分量	作 用	効能・効果
アセトアミノフェン (解熱鎮痛剤)	300mg	熱を下げるとともに、寒気をおさえ、頭痛や のどの痛み、筋肉の痛みなどをやわらげます。	悪寒、発熱、のどの痛み、頭痛、 関節の痛み、筋肉の痛み
クロルフェニランミンマレイン酸塩 (抗ヒスタミン剤)	2.5mg	くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどのアレルギー 症状をおさえます。	鼻水、鼻づまり、くしゃみ
dl-メチルエフェドリン塩酸塩 (気管支拡張剤)	20mg	交感神経に作用し気管支を広げ、呼吸を楽に してせきをしずめます。	せき、たん


添加物：キシリトール、還元麦芽糖水アメ、塩化Na、クエン酸、クエン酸Na、サッカリンNa、安息香酸Na、パラベン、プロピレングリコール、香料

用法・用量

年 令	3才以上7才未満	1才以上3才未満	6か月以上1才未満	3か月以上6か月未満	3か月未満
1 回量	8mL	6mL	4.5mL	4mL	服用しないこと

1日3回毎食後及び必要な場合には就寝前に服用してください。また、1日6回まで服用してもさしつかえありませんが、その場合には約4時間の間隔をあけてください。

添付の目盛り付きカップで量をはかり、服用してください。使用後のカップはよく水洗いし、本剤とともに清潔に保管してください。



安全キャップの使用法

- あけ方 図のように①キャップを強く押しながら②矢印の方向(時計と反対まわり)にまわしてあけます。キャップが固い時はお湯(50～60℃)で温めてください。
- しめ方 服用のつどピンの口の周囲をよくふいて、きれいにしてから、普通のキャップをしめる要領でしめてください。



〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法及び用量をお守りください。
- (2)小児に服用させる場合は保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。
- (5)いったん開栓した後は、品質保持の点から長期保存しないでください。

●お問い合わせは植屋奇応丸株式会社(発売元)まで

お客様相談室 電話：072-871-2990

〒574-0014 大阪府大東市寺川13-63

受付：月～金曜日(祝日を除く)9:00～17:30

植屋奇応丸ホームページアドレス <http://www.hiyakiogan.co.jp>



〈発 売 元〉

植屋奇応丸株式会社

〒530-0043 大阪市北区天満1-4-11

〈製造販売元〉

萬金薬品工業株式会社

〒634-0145 奈良県高市郡明日香村野口317