

【効能・効果】

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【成分・分量】1日量(90mL)中

リボフラビン……………6mg
 ビリドキシン塩酸塩……………30mg
 タウリン……………1800mg
 ニンジンエキス(原生薬999mg)……………90mg
 バクモンドウ流エキス(原生薬300mg)……………300μL
 カンゾウエキス(原生薬5000mg)……………1666.5mg
 添加物:ブドウ糖果糖液糖、白糖、D-ソルビトール、クエン酸、クエン酸Na、安息香酸Na、パラベン、プロピレングリコール、カラメル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、香料(アルコール0.9mL以下)

【用法・用量】大人(15歳以上)1回1本(30mL)を1日3回服用してください。

●用法・用量を厳守してください。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。(4)生薬成分を配合しているため、まれに沈殿が生じることがありますが、薬効には影響ありません。よく振ってから服用してください。

発売元 **株式会社 カイゲン**

大阪市中央区道修町2丁目5番14号
 お客様相談室 ☎06-6202-8911
 受付9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 **萬金薬品工業株式会社**

奈良県高市郡明日香村野口317



**発熱・疲労時の
栄養補給に**

ハイカイゲン内服液

第3類医薬品



カンゾウエキス
 バクモンドウ流エキス
 ニンジンエキス配合

発売元 **株式会社 カイゲン 30mL**

—【△使用上の注意】—

相談すること

1.次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)高齢者。
- (3)次の症状のある人。 むくみ
- (4)次の診断を受けた人。
 心臓病、高血圧、腎臓病

2.次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1)服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2)5~6日間服用しても症状がよくなる場合。

3.長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

使用期限

製造番号



ガラス:瓶
 金属:キャップ

副作用被害救済制度

☎0120-149-931