

使用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。

使用上の注意

❌(してはいけないこと)

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)
1.本剤を服用している間は、他の瀉下薬(下剤)を服用しないでください。

⚠️(相談すること)

1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)高齢者 (4)はげしい腹痛、吐き気・嘔吐のある人 (5)腎臓病の診断を受けた人
2.次の症状があらわれた場合は、直ちに服用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1)消化器：はげしい腹痛、吐き気・嘔吐 (2)精神神経系：強い眠気、意識がうすれる (3)循環器：立ちくらみ、脈が遅くなる (4)呼吸器：息苦しい (5)その他：筋力の低下、口のかわき
3.服用後、下痢があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4.1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能

- 便秘
- 便秘に伴う次の症状の緩和：腹部膨満、腸内異常醗酵、肌あれ、吹出物、痔、食欲不振(食欲減退)、頭重、のぼせ

副作用救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
電話：0120-149-931 (フリーダイヤル)
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

第3類医薬品 瀉下薬 600錠

イオナミンZ

IONAMIN



用法・用量

次の1回量を1日1回、就寝前(又は空腹時)にコップ1杯の水又はぬるま湯で服用してください。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。

年齢	成人(15歳以上)	11～14歳	7～10歳	5～6歳	5歳未満
1回量	3～6錠	2～4錠	2～3錠	1～2錠	使用しないこと

用法・用量に関連する注意

(1)用法・用量を厳守してください。(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分

6錠中：酸化マグネシウム・・・1980mg

添加物：結晶セルロース、クロスカルメロースナトリウム、ステアリン酸カルシウム

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



ボトル:PE バックキ:PE,PP
キャップ:PP 外装フィルム:PET
詰め物:PE



4 982181 020601

製造番号

使用期限

発売元
ゼットイオン研究所
東京都世田谷区深沢5-1-8

販売元
ゼットイオン薬品
東京都世田谷区深沢5-1-8

製造販売元
協和化学工業株式会社
森川町木田郡三木町井上2876-2

お客様相談窓口：電話：03-5707-1017
受付時間：土・日・祝日を除く 10:00～18:00