

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## ビタミンC主薬製剤

販売名: **トルビタ錠**

第3類医薬品

ビタミンCには、しみ・そばかすの原因となるメラニンの生成を抑え、色素沈着を緩和する働きがあります。また、コラーゲンの生成を促進する働きもあります。ビタミンCは、人の体内では作ることができない為、医薬品や食品から摂取することが必要です。トルビタ錠は、6錠中に2000mgのビタミンCを含有した医薬品です。

### ⚠ 使用上の注意

#### 相談すること



- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

下痢

- 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 効果・効能

#### ●次の諸症状の緩和:

しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

#### ●次の場合の出血予防:

歯ぐきからの出血、鼻血  
「ただし、これらの症状について、1ヶ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談してください。」

#### ●次の場合のビタミンCの補給:

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

### 用法・用量

次の回量を朝夕食後に水またはお湯で、かますに服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人(15歳以上)	1~3錠	1日2回
11歳以上15歳未満	1~2錠	
7歳以上11歳未満	1錠	
7歳未満	服用しないでください	

(用法・用量に関する注意)

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

▼裏面もお読みください

## 成分・分量

1日量(6錠)中

成 分	分 量
ビタミンCとして 〔アスコルビン酸(ビタミンC) アスコルビン酸カルシウム(ビタミンCのカルシウム塩)	2,000mg 1,400mg 726mg
リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB <sub>2</sub> )	6mg

添加物として、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、ショ糖脂肪酸エステルを含有します。

### 〈成分・分量に関する注意〉

- (1)本剤の服用により、尿が黄色くなることがあります。これは本剤中のビタミンB<sub>2</sub>によるものなので心配ありません。
- (2)本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。医師の治療を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせてください。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)ぬれた手等で触れた錠剤はびんに戻さないでください。  
(変色等の原因となり、品質が変わることがあります。)
- (5)使用期間を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持のため、6ヵ月以内に服用してください。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記まで  
ご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口：水橋保寿堂製薬株式会社 お客様相談室

**0120-50-4100**

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

### 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

電話：0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元 **水橋保寿堂製薬株式会社**

富山県富山市水橋山王町633