

この説明文書は本剤とともに保管し、服用に際しては必ずお読みください。

オニチール風ぐすり



使用上の注意

❌ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
(1) 本剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある人。(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気があらわれることがあります。)
4. 服用時は飲酒しないでください
5. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 授乳中の人。(4) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)。(5) 高齢者。(6) 本人又は家族がアレルギー体質の人。(7) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(8) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
(9) 次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	め ま い
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振	そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群、 (ステvens-ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
ぜんそく	

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。 口のかわき

成分・分量 1日量3包(1包800mg)中

アセトアミノフェン … 600mg マレイン酸クロルフェニラミン … 7.5mg
 エテンザミド … 500mg α-塩酸メチルエフェドリン … 30mg
 無水カフェイン … 150mg クエン酸チペピジン … 30mg
 添加物:リン酸水素カルシウム、含水二酸化ケイ素、バレイショデンプン

効能・効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和。

用法・用量

15才以上 … 1回1包 3才以上7才未満 … 1回 $\frac{1}{3}$ 包
 11才以上15才未満 … 1回 $\frac{2}{3}$ 包 1才以上3才未満 … 1回 $\frac{1}{4}$ 包
 7才以上11才未満 … 1回 $\frac{1}{2}$ 包

1日3回、食後なるべく30分以内に服用してください。

1才未満の乳児には服用させないでください。

【用法・用量に関連する注意】

- 1) 用法・用量を厳守してください。2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4) 配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。

<お問い合わせ先>製造元 美吉野製薬株式会社

奈良県吉野郡大淀町大岩692

TEL 0745-67-0144 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

H1404SA