

ご使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

総合かぜ薬 カゼゴジン液「小児用」

●カゼゴジン液「小児用」は、お子様のかぜの諸症状を緩和する薬剤で鼻みず・鼻づまり・くしゃみ・のどの痛み・咳・たん・悪寒・発熱・頭痛・関節の痛み・筋肉の痛みなどかぜの諸症状に対して速やかに効果を発揮して、かぜの治療を早める総合かぜ薬の液剤です。



使用上の注意

本剤は小児用ですが、かぜ薬として定められた一般的注意事項を記載しております。

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと

(眠気があらわれることがある。)

4. 服用時は飲酒しないこと

5. 長期連用しないこと

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人。
- (8) 次の診断を受けた人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。
ぜんそく	
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること

便秘、口のかき

効能・効果

かぜの諸症状（鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

用法・用量

3歳以上～7歳未満	1回 4.0mL
1歳以上～3歳未満	1回 3.0mL
6カ月以上～1歳未満	1回 2.4mL
3カ月以上～6カ月未満	1回 2.0mL

通常1日3回毎食後及び必要な場合には就寝前にも服用してください。場合により1日6回まで服用しても差し支えありませんが、その場合には原則として約4時間の間隔をおいて服用してください。（添付の計量カップをご使用ください）

〈用法及び用量に関する注意〉

- (1) 用法、用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (3) 1歳未満の乳児には、止むを得ない場合の他は、服用させないこと。

成分及び分量

(24mL中)

成分	分量	はたらき（作用）
アセトアミノフェン	300mg	発熱を止め、痛みをしずめます。
マレイン酸クロルフェニラミン	2.4mg	くしゃみ・鼻みず・鼻づまりなどアレルギー症状をおさえます。
リン酸ジヒドロコデイン	8mg	咳をしずめ、たんを切ります。
dl-塩酸メチルエフェドリン	10mg	咳をしずめ、たんを切ります。
無水カフェイン	50mg	下熱・鎮痛の効果を高めます。
カンゾウエキス （原生薬換算量：1200mg）	300mg	ノドのはれや炎症をしずめます。
ニンジン流エキス （原生薬換算量：240mg）	0.24mL	かぜによる体力の低下を防ぎ早期回復に役立ちます。
添加物として白糖、ポリリン酸Na、ピロリン酸Na、安息香酸Na、メタリン酸Na、パラベン、香料、その他1成分	甘味剤・安定剤 保存剤及び香料	

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 生薬エキス配合のため、まれにゴロリを生じることがありますが、変質したものではありません。よく振って服用してください。
- (5) 服用のつどビンの口をよく拭いてから、フタをしっかり締めておいてください。
- (6) 計量コップはご使用のつど、水洗いなどして常に清潔に保管してください。
- (7) キャップ開封時に手等を傷つけるおそれがありますので、注意してください。
- (8) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。なお、使用期限内であっても、なるべく速かに服用してください。

【かぜの養生法】

○かぜは過労や免疫力の低下による場合が多いので食事は玉子の白味などアミノ酸の多く含むものを充分補給するようにしてください。

○お部屋の乾燥に注意し湯気を立て「ノド」をいためないよう注意しましょう。

○入浴はなるべく熱が下がってから1～2日後にしてください。

○かぜは上気道の炎症を早く治すことです。外出から帰ったら必ず「うがい」をしてください。

○汗ばんだ下着は早く着替え、体を冷やさないよう又夜は何時もより早く就寝するようにしてください。

○せきが出るかぜ症状の方は外出の際、マスクを着けて外出するように心掛けてください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いいたします。

（株）エバース・ジャパン お客様相談室

電話 045-473-6870

受付時間 9:30～17:30（土・日・祝祭日を除く）

発売元
株式会社エバース・ジャパン
横浜市港北区新横浜 2-14-26
製造元
美吉野製薬株式会社
奈良県吉野郡大淀町大岩692