

止瀉薬 「赤玉」胃腸丸

使用上の注意

 **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください (母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 急性の激しい下痢、発熱を伴う下痢、血便、粘液便又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人。(本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがあります。)
 - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (6) 今までに薬によるアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、ぜんそく等)を起こしたことがある人。
 - (7) 次の症状のある人。 排尿困難
 - (8) 次の診断を受けた人。 心臓病、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
口のかわき、便秘、下痢

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

裏面へつづく

【成分・分量】 1日量(90丸:3420mg) 中

タンニン酸ベルベリン 300mg ロートエキス散20% ……150mg
ゲンノショウコ末 ……510mg (ロートエキス30mgに相当する。)
センブリ末 ……90mg

本剤は赤色の丸剤です。添加物として、乳糖、沈降炭酸Ca、デヒドロ酢酸Na、アルファ化トウモロコシデンプン、カルメロースCa、タルク、酸化チタン、アラビアゴム末、ヒドロキシプロピルセルロース、マクロゴール6000、色素〔赤色3号、黄色4号(タートラジン)〕を含有します。

【効能・効果】

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便、腹痛を伴う下痢

【用法・用量】

15才以上(大人) ……1回30丸
11才以上15才未満 ……1回20丸
8才以上11才未満 ……1回15丸
5才以上 8才未満 ……1回10丸

いずれも1日3回を限度とし、服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。5才未満の幼児には服用させないでください。

《用法及び用量に関連する注意》

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのお問い合わせは、下記にお問い合わせをお願いします。

美吉野製薬株式会社「お客様相談係」

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

〒638-0842 奈良県吉野郡大淀町大岩692

電話 (0745) 67-0144(代)

製造販売元

美吉野製薬株式会社

奈良県吉野郡大淀町大岩692

0507SA