

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

末梢血管障害、更年期に起こりがちな首すじのこり、手足のしびれ、のぼせなどに

# Eデスキャップ「300」〈天然のビタミンE剤〉

## Eデスキャップ「300」は

ビタミンE(トコフェロール)のソフトカプセル製剤で天然に存在する型のうち最もすぐれた生理活性を示すd- $\alpha$ (アルファ)型のビタミンEを用いています。また、 $\alpha$ 型天然ビタミンEに、 $\gamma$ -オリザノールが配合されているので、末梢血管障害や更年期に起こりがちな首すじのこりや手足のしびれ、のぼせなどに効果的であるほか老年期のビタミンEの補給に有効です。

### 作用と特長

#### 1. 末梢血液循環を改善します。

毛細血管の血流をよくする作用で、末梢血行障害による諸症状(冷え、手足のしびれ、しもやけなど)を緩和します。

#### 2. 更年期の不快な諸症状に効果を示します。

体内のホルモン分泌をよくするので、更年期の不定愁訴の諸症状(肩のこり、のぼせなど)を緩和します。

#### 3. 生理不順を緩和します。

#### 4. 老年期のビタミンEの補給をします。

老年期の方々の血管壁の運動性としなやかさを保ちます。

#### 5. 過酸化脂質の増加を防止します。

$\alpha$ 型ビタミンEは、1日量200～300mg(2～3カプセル)服用ですので、血管壁や血液中の過酸化脂質を減らします。



### 使用上の注意

#### 【相談すること】



##### 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること。

医師の治療を受けている人。

##### 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位  | 症 状       |
|-------|-----------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消 化 器 | 胃部不快感     |

(2) 1カ月位服用しても症状がよくならない場合

##### 3. 生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがある。

出血が長く続く場合は、医師又は薬剤師に相談すること。

##### 4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。

便秘、下痢

### 効能効果

○末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、手足のしびれ、冷え、しもやけ

○更年期における次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、冷え、手足のしびれ、のぼせ

○月経不順

「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

○次の場合のビタミンEの補給：老年期

### 用法・用量

次の量を水又はお湯と一緒にかまわずに服用すること。

| 年 齢      | 1 回 量     | 1 日 服 用 回 数 |
|----------|-----------|-------------|
| 15 歳 以 上 | 1 カ プ セ ル | 2 ～ 3 回     |
| 15 歳 未 満 | 服用しないこと   |             |

(1) 用法及び用量を厳守すること。

(2) 1日2回服用する場合は朝晩、1日3回服用する場合は朝昼晩服用する。

### 成分・分量(3カプセル中)

| 成分                   | 3カプセル中(1日量) |
|----------------------|-------------|
| d- $\alpha$ -トコフェロール | 300mg       |
| $\gamma$ -オリザノール     | 10mg        |

添加物としてダイズ油、ゼラチン、濃グリセリンを含有する。

### 保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

(4) 使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点から6カ月以内に使用してください。

(5) 本剤は、湿気の影響を受けやすいので、濡れた手で触れたカプセルをビンに戻したり、水滴などを誤ってビンに入れしないでください。

(6) ビンのフタのしめ方が不十分な場合、湿気などの影響で薬が変質することがありますので、服用のつどフタをよくしめてください。

(7) ビンの中の詰め物は、輸送中のカプセルの破損を防止するために入れてありますので、フタをあけた後はすててください。

■お問い合わせ先 美吉野製薬株式会社 お客様相談室

電 話 0745-67-0144(代表)

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売業者 美吉野製薬株式会社

〒638-0842 奈良県吉野郡大淀町大岩692

電 話 0745-67-0144(代表)

0501SA