


ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

肌あれ、にきび、口内炎、目の充血に

第3類医薬品

エバセチンゴールド



(皮膚の断面図)

- 本品の主成分であるFAD（フラビン・アデニン・ジヌクレオチド）はビタミンB₂の活性型で補酵素として働きます。通常ビタミンB₂は体の中に吸収される過程でFR（リボフラビン）からFMN（フラビン・モノ・ヌクレオチド）そしてFADに変化して初めて補酵素として作用します。
- 本品はその活性型B₂であるFADを直接1日分24mg配合しており肌あれ・ニキビ・口内炎・目の充血などのビタミンB₂不足による諸症状の緩和に役立ちます。

又、昔から漢方で肌あれの薬とされるハトムギから得たヨクイニンエキスを180mg配合し、更に皮膚のビタミンとして知られるビタミンC・ビタミンB₆・ビオチン(ビタミンH)を加えよりその効果を高めています。
又、忙しい毎日の肉体疲労や妊娠授乳期の栄養補給、風邪などの体力低下時にもお役に立ちます。

⚠使用上の注意



相談すること

1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合も服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。


効 能

・次の諸症状の緩和

肌あれ、ニキビ、口内炎、目の充血、目のかゆみ、口角炎、口唇炎、舌炎、湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ、赤鼻
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師または薬剤師に相談してください。」

・次の場合のビタミンB₂の補給

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時



用法・用量

下記の1回量を1日2回、食後に服用してください。

年 齢	大人（15歳以上）	15歳未満
1 回 量	1 錠	服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>

定められた用法・用量を厳守してください。



エバセチンゴールドは、皮膚の健康を保ち皮膚粘膜に働くFAD、ヨクイニンなど6つの成分を配合!!

成分・分量と働き 1 日量 (2 錠) 中

成 分	分 量	働 き
フラビンアデニジヌクレオチドナトリウム (FAD)	24mg	皮膚や粘膜の正常な働きを助 けます。脂質やたんぱく質の 代謝に関与します。口内炎や にきびなどを改善します。
ピリドキサルリン酸塩水和物 (活性型ビタミンB ₆)	50mg	
ニコチン酸アミド	60mg	
ビオチン (ビタミンH)	500μg	肌の新陳代謝を助けます。 皮膚の炎症を緩和します。
アスコルビン酸 (ビタミンC)	100mg	コラーゲン生成を助けます。 皮膚や粘膜を丈夫にします。
ヨクイニンエキストラクト-N (原生葉換算量：2,340mg)	180mg	ハトムギ由来のヨクイニン乾 燥エキスです。肌あれに効果 を発揮します。



添加物として、結晶セルロース、カルメロース、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴール、カルナウバロウを含有する。

<成分・分量に関連する注意>

本剤に含まれるFADにより尿が黄色くなることがあります。

<保管及び取扱い上の注意>

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

<包装単位>

エバセチンゴールドは携帯に便利な12錠の
PTP包装になっています。

エバセチンゴールド36錠(PTP12錠×3)

エバセチンゴールド96錠(PTP12錠×8)




副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

フリーダイヤル ☎ 0120-149-931



エバセチンゴールドに関するお問い合わせ、服用相談は

株式会社エバース・ジャパン TEL 045-473-2391(代表)
月～金10:00～17:00(土、日祝日を除く)にお願い致します。

開 封 日

年 月 日

《発売元》
株式会社エバース・ジャパン
横浜市港北区新横浜2-14-26
《製造販売元》
美吉野製薬株式会社
奈良県吉野郡大淀町大岩692

1301S