

ご使用の際には、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労時の栄養補給に

ガルレバン®G

肝臓加水分解物・カンゾウ・ロクジョウ配合

ガルレバンG〈糖衣錠〉は、

新鮮な哺乳動物の肝臓を酵素で分解して得られた肝臓加水分解物を主剤としており、肝臓における栄養代謝や、解毒機構に関与し、強壮作用のあるロクジョウと共に有用なアミノ酸として働き、虚弱体質を改善します。更に、様々な効果のあるカンゾウの働きとエネルギー産生系に働くビタミンB₂・B₆がプラスされて、滋養強壮に、又、肉体疲労、病中病後、発熱性消耗性疾患、胃腸障害、栄養障害、妊娠授乳期などの栄養補給に優れた効果のある服用しやすい糖衣錠です。



使用上の注意



相談すること

次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

効能・効果

- 滋養強壮
- 虚弱体質
- 肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法・用量

次の1回量を1日3回服用してください。

年 齢	成人（15才以上）	15才未満
1回量	2 錠	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守してください。

成分・分量

成人1日の服用量6錠（1錠420mg）中に次の成分を含みます。

肝臓加水分解物	600mg
カンゾウ乾燥エキス	160mg
（原生薬換算量：800mg）	
ロクジョウ末	12mg
リボフラビン（ビタミンB ₂ ）	12mg
塩酸ピリドキシン（ビタミンB ₆ ）	6mg

添加物としてセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、リン酸水素Ca、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、アラビアゴム、ゼラチン、白糖、マクロゴール、タルク、炭酸Ca、酸化チタン、カルメロースNa、カルナウバロウを含有します。

（成分に関連する注意）

本剤の服用により尿が黄色くなることがあります。（本剤に含まれるリボフラビンによるものです。）

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

■お問い合わせ先 美吉野製薬株式会社 お客様相談室
電 話 0745-67-0144（代表）
受付時間 10時から17時まで（土、日、祝日を除く）

《製造販売業者》

美 吉 野 製 薬 株 式 会 社

奈良県吉野郡大淀町大岩692

0407SA