

KENRIKI

ケンリキ

発熱性消耗性疾患の
栄養補給に

使用期限

30mL

製造番号

医薬品

販売名：ケンリキ

【使用上の注意】

相談すること

1次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1) 血圧の高い又は高齢者。 (3) むくみのある人。
(2) 心臓又は腎臓に障害のある人。 (4) 医師の治療を受けている人。

2次の場合は、服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1) 本剤を服用することにより、尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等の症状があらわれる場合。
(2) 数日間服用しても症状の改善がみられない場合。

【成分・分量】1日量(90mL)中

カンゾウエキス……………900mg アミノエチルスルホン酸……………1500mg
ロクジョウチンキ……………35μL 塩酸ピリドキシン……………15mg
オロト酸コリン……………150mg (アルコール……………1.0mL以下)

添加物として香料、安息香酸ナトリウム、パラベンを含有する。

【効能・効果】

発熱性消耗性疾患・病中病後・腎臓障害・肉体疲労・栄養障害・産前産後などの場合の栄養補給、滋養強化、虚弱体質。

【用法・用量】

大人(15才以上)1回1瓶(30mL)を1日3回服用。

【用法・用量に関連する注意】

1. 定められた用法・用量を厳守して下さい。
2. 長期連用しないで下さい。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
5. キャップリングの切れたものは服用しないで下さい。
6. キャップの開栓に際しては十分気をつけ、万が一飲み口が破損した場合は服用しないで下さい。
7. 生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用して下さい。

製造元 美吉野製薬株式会社 奈良県吉野郡大淀町大岩592
TEL 0745 67 0144 受付時間10:00～17:00(土・日・祝日を除く)



0202E