



ここからお切りください

開封後はチャックを閉めて保存してください



生薬のチカラで便秘を改善

べん っ っ う じ よ う

弁通錠

新大和漢方株式会社



180錠
(30日分)

第②類医薬品

開封後はチャックを開けて保存してください。
ご使用の際には、この説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。



第②類医薬品 **新大和漢方** しんやまとかんぽう
販売名：弁通錠 べんつうじょう

内容量 180錠
(30日分)

⚠ 使用上の注意

❌してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 1.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の瀉下薬(下剤)
- 2.授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
- 3.大量に服用しないでください
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

🗨 相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5)次の症状のある人。
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
- 3.服用後、次の症状があらわれたことがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
- 4.1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

- 便秘
- 便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

用法・用量

次の量を、朝夕の空腹時(又は食前あるいは食間)に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	2～3錠	2回
15歳未満	服用しないでください	

ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。

用法・用量に関連する注意

用法・用量を厳守すること。

成分・分量

1日量6錠(1錠325mg) 中

ア ロ エ 末	300mg
ダ イ オ ウ 末	300mg
セ ン ナ 末	600mg
カ ン ゾ ウ 末	150mg

添加物として、軽質無水ケイ酸、カルメロースCa、クロスカルメロースNa、ステアリン酸Mgを含有します。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お客様窓口】(商品に関するご質問・お問い合わせ)

☎ 0120-702-866

(午前9時～午後5時 土・日・祝日を除く)

【副作用被害救済制度のお問い合わせ先】

(独)医薬品医療機器総合機構

☎ 0120-149-931

【発 売 元】新大和漢方株式会社

福岡県福岡市早良区千隈3-16-1

【製造販売元】美吉野製薬株式会社

奈良県吉野郡大淀町大岩692



製造番号

使用期限