

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

幼児から少年期まで お子さんの かぜぐすり

ママベビー かぜ S

医薬品

【特 徴】

- ・本剤は、薬嫌いのお子さんにも服みやすい、かぜ薬です。
- ・解熱鎮痛成分としてアセトアミノフェン、エテンザミドを配合して発熱、悪寒、関節や筋肉の痛みをおさえます。
- ・マレイン酸クロルフェニラミンが鼻づまりなどを和らげ、dl-塩酸メチルエフェドリンが気管支をひろげ、ヒペンズ酸チペピジン、グアヤコールスルホン酸カリウムがせき、たんに効果を表します。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

- 1.次の方は服用しないでください。  
(1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(2)本剤または他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 2.本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。  
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去たん薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）
- 3.服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください。  
(眠気があらわれることがあります。)
- 4.服用時は飲酒しないでください。
- 5.長期連用しないでください。



相談すること

- 1.次の方は服用前に医師または薬剤師に相談してください。  
(1)医師または歯科医師の治療を受けている人。  
(2)妊婦または妊娠していると思われる人。  
(3)授乳中の人。  
(4)水痘（水ぼうそう）若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児（15歳未満）。  
(5)高齢者。  
(6)本人または家族がアレルギー体質の人。  
(7)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(8)次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
- (9)次の診断を受けた人。  
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 2.次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください。  
(1)服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位  | 症 状        |
|-------|------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ  |
| 消 化 器 | 悪心・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい        |
| そ の 他 | 排尿困難       |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称              | 症 状                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| ショック<br>(アナフィラキシー) | 服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔面が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれます。 |

| 症状の名称                                                   | 症 状                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 皮膚粘膜眼症候群<br>(スティーブンス・ジョンソン症候群)<br>中毒性表皮壊死症<br>(ライエル症候群) | 高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい<br>症状が <sup>3</sup> 、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれます。                                                          |
| 肝機能障害                                                   | 全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれます。                                                                                               |
| 間質性肺炎                                                   | 空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発<br>熱等があらわれます。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別<br>が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合に<br>も、服用を中止するとともに、医師の診療を受けてください。) |
| ぜんそく                                                    |                                                                                                                               |

(2)5～6回服用しても症状がよくならない場合

3.次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られ  
た場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。

口の渇き

## 〔効能又は効果〕

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、  
頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和。

## 〔用法及び用量〕

| 年 齢         | 1 回量            | 1 日服用回数 |
|-------------|-----------------|---------|
| 7 歳以上15 歳未満 | 1 包             | 3 回     |
| 3 歳以上7 歳未満  | $\frac{2}{3}$ 包 |         |
| 1 歳以上3 歳未満  | $\frac{1}{2}$ 包 |         |
| 1 歳未満       | 服用させないこと        |         |

(1)食後、なるべく30分以内に、服用してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(3)1包を分けて服む場合は、服用残りを図の様に、袋の口を、3回  
以上、強く折り返し、なるべく吸湿しないように保管して、2日  
以内に服用してください。



## 〔成分及び分量〕

1 日量(3 包) 中

(1 包 2 g)

| 成 分             | 含 量    | は た ら き                          |
|-----------------|--------|----------------------------------|
| アセトアミノフェン       | 330mg  | 熱を下げ、痛みを和らげます。                   |
| エテンザミド          | 200mg  |                                  |
| マレイン酸クロルフェニラミン  | 3.75mg | 鼻水・鼻づまり・くしゃみを和らげます。              |
| ヒベンズ酸チペピジン      | 30mg   | せき中枢に働き、せきを鎮めます。たんを<br>出しやすくします。 |
| dl-塩酸メチルエフェドリン  | 30mg   | 気管支を拡張して、せきを和らげます。               |
| グアヤコールスルホン酸カリウム | 90mg   | たんを出しやすくします。                     |

添加物としてデキストリン、カルメロースNa、黄色4号(タートラジン)、白糖、  
香料を含有する。

## 〔保管および取扱い上の注意〕

(1)直射日光の当たらない、湿気の少ない、涼しい所に保管してくだ  
さい。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質  
が変化します。)

(4)期限を過ぎた製品は服用しないでください。



お客様相談窓口 明治製薬株式会社 TEL 076-476-1111  
9:00～17:00(土、日、祝祭日は除きます。)



製造販売元  
**明治製薬株式会社**  
富山県滑川市中川原77