

2009年 3 月改訂

2007年11月作成

服用に際し、この説明書を必ず読むこと。また、必要なとき読めるように大切に保管すること。

十全大補湯(漢方薬)

# 補全-S

第2類医薬品

本品は漢方処方「十全大補湯」を服用しやすくしたシロップ剤です。  
「十全大補湯」は慢性諸病による体力低下をはじめとして、疲労倦怠、貧血、手足の冷えなどにすぐれた効果を発揮いたします。



## 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること。
  - 1) 医師の治療を受けている人。
  - 2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
  - 3) 胃腸の弱い人。
  - 4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみなどを起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師または薬剤師に相談すること。
  - 1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

| 関 係 部 位 | 症 状       |
|---------|-----------|
| 皮 膚     | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消 化 器   | 胃部不快感     |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称 | 症 状                             |
|-------|---------------------------------|
| 肝機能障害 | 全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）などがあらわれる。 |

- 2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合。
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談すること。

下痢

## 成分分量

1日量（10mL）中

十全大補湯エキス1,000mg配合

本エキス1,000mgは下記の生薬より抽出したものです。

|       |      |       |      |
|-------|------|-------|------|
| ニンジン  | 1.5g | オウギ   | 1.5g |
| ソウジュツ | 1.5g | ブクリョウ | 1.5g |
| トウキ   | 1.5g | シャクヤク | 1.5g |
| ジオウ   | 1.5g | センキュウ | 1.5g |
| ケイヒ   | 1.5g | カンゾウ  | 0.5g |

添加物としてハチミツ、白糖、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、フマル酸Na、エタノール、安息香酸Na、パラベン、バニリン、エチルバニリン、香料を含有する。

## 効能効果

体力虚弱なものの次の諸症：

病後・術後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血。

## 用法用量

成人（15才以上） 1回 5mLを1日2回服用する。よく振ってから服用すること。15才未満は服用しないこと。

（計量には添付の目盛り付きコップを使用ください。数字の単位はmLです。）

## 保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
2. 小児の手のとどかない所に保管すること。
3. 他の容器に入れかえないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
4. 開栓後はフタをしっかりとしめ、冷蔵庫に立てて保管すること。
5. 雑菌などの汚染の恐れがあるので、ピンの口に直接口をつけて服用したり、目盛り付きコップに入れたものをビンに戻さないこと。
6. 品質保持の点から、開栓後早めに服用すること。
7. 開栓後、味・においなどに変化があり異常を感じた場合には、直ちに服用を中止すること。
8. 生薬成分を配合した内服液です。まれに沈でんを生じることがあるため、よく振ってから服用すること。
9. ピンの口、目盛り付きコップは清潔に保つこと。
10. 表示の使用期限を過ぎたものは服用しないこと。

## 〔問い合わせ先〕

1. 購入した薬局・薬店
2. 日水製薬株式会社

お客様相談窓口 電話：03-3837-0987

受付時間：午前10時～12時 午後1時～5時  
（土・日・祝日を除く）

発売元



**日水製薬株式会社**

東京都台東区上野3-23-9

製造販売元



**明治薬品株式会社**

富山県富山市三郷6番地

副作用被害救済制度の問い合わせ先  
（独）医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

☎0120-149-931