

病後の
体力の低下を
回復させる

十全大補湯エキス製剤

13-6-C

200mL

【販売名】
補全-S
（漢方製剤）

第2類医薬品

↑
押して開ける

△ 使用上の注意

■ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - （1）衰弱の体質を受け持っている人。
 - （2）妊娠又は妊婦していると思われる人。
 - （3）腎臓の弱い人。
 - （4）今までに薬などにアレルギー・発疹、発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、本製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

また下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、尿色尿、全身の倦怠感、食欲不振等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増悪が見られた場合には、服用を中止し、本製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
- 下痢

4. 1ヵ月間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、本製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

（成分・分量）1日量（10mL）中
十全大補湯エキス1.000mg配合
本エキス1.000mgは下記の生薬より抽出したものです。
 ニンジン 1.5g ショウジョ 1.5g トウキ 1.5g
 ジョウ 1.5g タイシ 1.5g オウゴン 1.5g
 ブクジョウ 1.5g ショウヤク 1.5g センキュウ 1.5g
 カンゾウ 0.5g
 添加物としてハチミツ、白糖、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、フマル酸Na、エチルアルコール、安息香酸Na、ブドウ糖（ラベン、バニリン、エチルバニリン、香料を含有します。（アルコールを含有します。））

（効能・効果）
体力増進などの次の諸症：病後・術後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、めまい、手足の冷え、貧血

（用法・用量）
成人（15歳以上）1回5mLを1日2回服用して下さい。よく振ってから服用して下さい。〈添付の自量りカップ（5および10mL自量付）で服用して下さい。〉15歳未満は服用させないで下さい。

（保管及び取扱い上の注意）

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
 - 小児の手の届かない所に保管して下さい。
 - 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
 - 服用のつどビン口の周囲を清潔に拭いてからキャップをしめて下さい。
 - 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
 - 一度フタを開けた後は、なるべく長期間の服用は避けて下さい。
- ※本剤は生薬成分を配合した内服液ですので、まれに沈みを生じることがありますが、よく振ってから服用して下さい。

副作用報告徴知 0120-149-931

製造販売元

明治薬品株式会社
東京都葛飾区新小岩5-1-1

使用期限

製造番号

十全大補湯エキス製剤

疲労倦怠・食欲不振

生薬を
10種類配合

病後の
体力低下

食欲不振

疲労倦怠

手足の冷え

第2類医薬品

十全大補湯エキス製剤

病後の
体力の低下を回復させる

生薬を
10種類配合

病後の
体力低下

食欲不振

疲労倦怠

手足の冷え

第2類医薬品

十全大補湯エキス製剤

手足の冷え・貧血

生薬を
10種類配合

病後の
体力低下

食欲不振

疲労倦怠

手足の冷え

第2類医薬品



本製品内容についてのお問い合わせ
1. お買上げのお店
2. 製造販売元 明治薬品株式会社
お電話相談室 0120-53-3451
9:00~17:00（土、日、祝、特設休日を除く）