

添付文書改訂年月
2008年12月

©

第2類医薬品

ノルバスK錠

(漢方製剤)

使用目標

本剤中のブクリョウは利尿、タクシャ・シャゼンシ・カッセキ・モクツウは消炎・利尿、サンシシ・オウゴンは解熱・消炎、シャクヤク・トウキは鎮痛・鎮静、およびシャクヤク・カンゾウは鎮痛・鎮痙の作用がある。

したがって、尿道、膀胱等に異和感があり、これによって生じた小便が近くて、1回の量が少ない、または小便が出るときに尿道が痛み、尿がにごるもの、排尿後すつきりせず残尿感のあるものを目標とするとよい。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (4) 高齢者。
- (5) 次の症状のある人。

むくみ

(6) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること

下痢

(裏面もお読みください)

用法・用量

次の1回量で、1日3回食前又は食間に服用する。

年 齢	服用量
成人（15歳以上）	1回3錠
7歳以上15歳未満	1回2錠
7歳未満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

効能・効果

頻尿、排尿痛、残尿感

成分・分量

（成人1日量）9錠中

五淋散料エキス 2.6g

（以下より抽出）

シャクヤク	1.0g	ジオウ	1.5g
サンシシ	1.0g	タクシャ	1.5g
ブクリョウ	3.0g	モクツウ	1.5g
トウキ	1.5g	カッセキ	1.5g
カンゾウ	1.5g	シャゼンシ	1.5g
オウゴン	1.5g		

添加物として、無水ケイ酸、乳糖水和物、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mgを含有します。

保管及び取扱い上の注意

※使用のたび、必ずフタはすぐにきちんと閉めること。

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- （2）小児の手の届かない所に保管すること。
- （3）他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- （4）使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- （5）本剤は、生薬成分を配合していますので、製品により若干色調が異なることがあります。効能・効果には変わりありません。
- （6）瓶内に乾燥剤が入っていますが、服用しないこと。



本製品内容についてのお問い合わせは

①お買い上げのお店

②お客様相談室：明治薬品株式会社

電 話：(03)3253-3451

受 付 時 間：9:00～17:00(土、日、祝日、特定休日を除く)



製造販売元

明治薬品株式会社

富 山 県 富 山 市 三 郷 6 番 地

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)