

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鎮咳去痰薬

第2類医薬品

つらいせき・たんに

特納用

プレコール[®]せき止め錠A

プレコールせき止め錠Aの特徴

- 鎮咳成分ジヒドロコデインリン酸塩が、せき中枢にはたらいてつらいせきをしずめます。
- dl-メチルエフェドリン塩酸塩をはじめとした2種類の気管支拡張成分が、気管支をひろげてせきをやわらげ呼吸を楽にしたんを出しやすくなります。
- 抗アレルギー成分のd-クロルフェニラミンマレイン酸塩が、アレルギー性のせきをしずめます。



使用上の注意



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 1. 次の人は服用しないで下さい。
12歳未満の小児
- 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
- 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。
(眠気等があらわれることがあります)
- 4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。
- 5. 過量服用・長期連用しないで下さい。



相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 高齢者
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の症状のある人
高熱、排尿困難
 - 次の診断を受けた人
心臓病、高血圧、糖尿病、線内障、甲状腺機能障害、てんかん、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|-------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消 化 器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい |
| 循 環 器 | 動悸 |
| 泌 尿 器 | 排尿困難 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

| 症状の名称 | 症 状 |
|---------|---|
| 再生不良性貧血 | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる。 |
| 無顆粒球症 | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。 |
| 呼吸抑制 | 息切れ、息苦しさ等があらわれる。 |

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

便秘、口のかわき、眠気

4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

■ 効能・効果

せき、たん

■ 用法・用量

次の量を水又はお湯で服用して下さい。

| 年 齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|------------|------------|-------------------|
| 15 歳 以 上 | 3錠 | 3回 食後に服用して下さい。 |
| 12歳以上15歳未満 | 2錠 | |
| 12 歳 未 滿 | 服用しないで下さい。 | |

〈用法・用量に関する注意〉

(1)用法・用量を厳守して下さい。

(2)12歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

(3)錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用して下さい。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)



■ 成分・分量


本剤は、白色のフィルムコーティング錠で、9錠中に次の成分を含有しています。

| 成 分 | 分 量 | はたらき |
|-------------------|------|--|
| ジヒドロコデインリン酸塩 | 30mg | せき中枢にはたらき、 せきをしめます。 |
| dl-メチルエフェドリン塩酸塩 | 52mg | 気管支をひろげてせきをやわらげ呼吸を 楽にし、たんを出しやすくします。 |
| ジプロフィリン | 90mg | |
| d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 6mg | アレルギー性のせきをしめます。 |

添加物:乳糖、セルロース、カルメロースNa、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、タルク、ヒプロメロース

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が
変わります)
- (4)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。



本品についてのお問い合わせは、下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電 話 0120-337-336
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

02®登録商標



販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
Daiichi-Sankyo
東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元
明治薬品株式会社
岐阜県富山市三郷6番地