

服用前にこの説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。



中性脂肪異常改善薬／日本薬局方 イコサペント酸エチルカプセル

# イパデールT

第1類医薬品

- ◆イパデールTは、イコサペント酸エチルを主成分とし、健康診断等で指摘された境界領域の中性脂肪値を改善するお薬です。
- ◆中性脂肪異常は、脂質代謝のバランスが崩れて血中の中性脂肪が異常に増えた状態であり、中性脂肪異常の改善は、生活習慣病や心血管疾患等の動脈硬化性疾患を発症するリスクの軽減につながります。
- ◆イコサペント酸エチルには、肝臓での過剰な中性脂肪合成を抑え、血中の余分な中性脂肪の代謝をはやくして中性脂肪の高値を改善する作用があります。また、他の作用として、動脈のしなやかな弾力性を保持する作用や、血小板の凝集をおさえ血流をスムーズな状態に導く作用があります。

## 服用に関しての重要な注意

- 中性脂肪異常の改善には、生活習慣の改善(食事・運動・禁煙)をあわせておこなうことが大切です。
- 医療機関等における血液検査の結果として、中性脂肪値の改善がみられない場合は、服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。



## 使用上の注意



### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人には服用しないでください

- (1) 20才未満の人。
- (2) 出血している人。  
(血友病、毛細血管脆弱症、消化管潰瘍、尿路出血、喀血、硝子体出血等にて出血している場合、止血が困難となることがあります)
- (3) 出血しやすい人。(出血を助長することがあります)
- (4) 手術を予定している人。(出血を助長することがあります)
- (5) 次の医薬品を服用している人。  
ミフェブリントン及びミソプロストールを含有する人工妊娠中絶薬、ワルファリン等の抗凝固薬、アスピリンを含有するかぜ薬・解熱鎮痛薬・抗血小板薬、インダメタシンを含有する鎮痛消炎薬、チクロビジン塩酸

塩やシロスタゾール等の抗血小板薬  
(出血傾向が強くなることがあります)

- (6) 脂質異常症(高脂血症)、糖尿病又は高血圧症と診断され現在医師の治療を受けている人、あるいは健康診断等で医師の治療を勧められた人。
- (7) 親、兄弟姉妹に原発性高脂血症と診断された人がいる人。
- (8) 狹心症、心筋梗塞、脳卒中と診断されたことがある人。
- (9) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (10) 授乳中の人は、動物試験で乳汁中への移行が認められています



## 相談すること



① 次の人には服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人又は他の医薬品を服用している人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

関係部位	症 状
その他	ほてり、顔面がほてって赤くなる、発熱、関節痛、筋肉痛、手足の痛み、筋肉のひきつり(こむらがえり等)、むくみ、全身のだるさ、女性化乳房(男性にみられる女性のような乳房)、耳なり、発汗、血圧上昇

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
心房細動、心房粗動*	動悸、胸の不快感、めまい、脈がとぶ等があらわれる。

③ 服用後、生理の経血量が多くなったり、出血が長く続く場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

④ 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

下痢、便秘、口のかわき

⑤ 服用3~6ヵ月後の血液検査で中性脂肪値の改善がみられない場合は、服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

## 効能

### ●健康診断等で指摘された、境界領域<sup>注)</sup>の中性脂肪値の改善

注)「境界領域」:健康診断などにおいて中性脂肪が正常値よりもやや高めの値(150mg/dL以上300mg/dL未満)を指す。

#### [注意]

狭心症、心筋梗塞、脳卒中と診断されたことがある人、脂質異常症(高脂血症)、糖尿病、高血圧症で治療中の人が医師の治療を勧められた人は、この薬を服用しないでください。

## 用法・用量

次の量を食後すぐに服用してください。

20才以上	1回1包
1日3回	食後すぐ

#### [注意]

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
  - (2)空腹時に服用すると成分の吸収が悪くなるので、食後すぐに服用してください。
  - (3)かまくに服用してください。(軟カプセルのため、かむと油状の成分がでてしまします)
  - (4)中性脂肪異常値改善のために4週間以上、服用を続けていただくことが必要です。
  - (5)本剤の服用期間の目安(効果が安定する)は、3~6ヶ月です。
  - (6)本剤の服用開始3ヶ月後には、医療機関等で血液検査を行い、中性脂肪値の改善を確認してください。
- 血液検査にあたっては、中性脂肪値に影響を及ぼすため、検査前10時間以上は、水以外の飲食物を摂取しないようにする必要があります。

#### このようにお飲みください

- この凸部をつまんで矢印→の方向にあけてください。
- 開封するときは、切り口を上にして静かにあけてください。(中のお薬が飛び散らないように注意してください)
- 中のお薬を手に移さないで、直接袋から口に入れてください。
- お湯などの温かい飲み物にお薬を混ぜないでください。



## 成 分

1包中 イコサペント酸エチル 600mg

添加物：トコフェロール、ゼラチン、D-ソルビトール、グリセリン、パラベン

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。



連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室  
電話 03-3985-1800

受付時間 8:30~17:00(土、日、祝日を除く)

※受付時間の詳細は、大正製薬ホームページにてご確認ください

「エパデルT®」は持田製薬株式会社の登録商標です。

発売元

大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号

https://brand.taisho.co.jp/epadel-t/

製造販売元

持田製薬株式会社

東京都新宿区四谷1丁目7番地

## 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 [https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話：0120-149-931(フリーダイヤル)