

かぜによる 鼻水・鼻づまり・くしゃみ・せき・たん

かぜ薬 漢元ハヤオキ ツー

顆粒タイプ 12包入

生 薬

小青竜湯
エキス

4つの効き目成分

アセトアミノフェン
クロルフェニラミンマレイン酸塩
チベピジンヒベンズ酸塩
無水カフェイン

「漢元ハヤオキ ツー」は、鼻かぜの症状である鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せきによく効く漢方薬の小青竜湯エキスに、熱を下げ、痛みによく効くアセトアミノフェン、無水カフェイン、せきをしずめるチベピジンヒベンズ酸塩、鼻水、鼻づまり、くしゃみなどのアレルギー症状を抑えるクロルフェニラミンマレイン酸塩などの西洋薬を配合した顆粒タイプの医薬品です。かぜの諸症状にすぐれた効き目をあらわします。

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

- 次の人は服用しないこと
 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
(眠気等があらわれることがある。)
- 服用前後は飲酒しないこと
- 長期連用しないこと



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
 - 次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、 のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発 赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブ ツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食 欲がない等が持続したり、急激に悪化 する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目 が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、 食欲不振等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりす ると息切れがする・息苦しくなる、空せ き、発熱等がみられ、これらが急にあら われたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒュー と鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮 膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動 悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとす る、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等が あらわれる。
腎障害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだ るさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等が あらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このよ
うな症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を
中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者
に相談すること □のかわき、眠気
- 5〜6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中
止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に
相談すること

成分及び分量とその働き 1日量(3包)中(1包1,500mg)

成 分	分 量	作 用
アセトアミノフェン	900mg	熱を下げ、頭痛やのどの痛みをやわらげます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどを抑えます。
チベピジンヒベンズ酸塩	75mg	すみやかにせきをしずめます。
無水カフェイン	100mg	頭痛をしずめます。
小青竜湯エキス	900mg	鼻かぜの主症状である「くしゃみ、鼻水、鼻づまり」などによく効く漢方薬です。
マオウ(麻黄) 0.6g、シャクヤク(芍薬)0.6g、 カンキョウ(乾姜) 0.6g、カンゾウ(甘草) 0.6g、 ケイヒ(桂皮) 0.6g、サイシン(細辛) 0.6g、 ゴミシ(五味子) 0.6g、ハンゲ(半夏) 1.2g		

添加物として、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、バレイショデンプン、結晶セルロース、カルメロースCaを含有します。

効能又は効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、のどの痛み、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法及び用量

次の量を、1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数	年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包 	3 回	3歳以上7歳未満	1/3包 	3 回
11歳以上15歳未満	2/3包 		1歳以上3歳未満	1/4包 	
7歳以上11歳未満	1/2包 		1歳未満	服用しないこと	

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法及び用量を厳守すること。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (3)2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
4. 1包を分割した残りは袋の切り口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。
5. 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。



お問い合わせ先

お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

薬王製薬株式会社「お客様相談室」

電 話 0744-33-8855

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

薬王製薬株式会社 奈良県磯城郡田原本町245番地