

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

こぎくみょうけんがん
杞菊妙見丸

商品番号
E306

本剤は、漢方の古典「^{い きゅう}医級」に収載された処方^{い きゅう}に準拠して製造された丸剤です。

老化は目からくる、ともしばしばいわれるように、中高年になると疲れやすくなったり、トイレが近い、気持よく出ない、などといった症状とともに、目が疲れやすくなる、目が充血したり痛みを覚えるとか、かすんで細かな字が見にくくなったりすることがあります。

これは若い人でもパソコンなどのO A機器で目を酷使したあとなどにもみられる現象ですが、中医学では^{かんじんいん きょ}肝腎陰虚によって起こるとされています。

^{こ ぎくみょうけんがん}杞菊妙見丸は、^{ろく み じ おうがん}六味地黄丸に^{く こし}枸杞子（クコの実）と^{きく か}菊花（菊の花）を加えた薬です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部圧迫感、腹痛

- (2) 1 ヶ月位服用しても症状がよくなりえない場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください

下痢

【効能・効果】

疲れやすくて、顔・手足がほてり、尿量減少又は多尿で、ときに口渇があるものの次の諸症：

疲れ目、かすみ目、のぼせ、めまい、頭重、排尿困難、頻尿、むくみ。

（裏面につづく）

【用法・用量】

水又は白湯（さゆ）で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	8丸	3回
15歳未満	服用しないでください	


【成分・分量】

成分・分量（本剤24丸中）			
クコシ	0.288 g	サンヤク	0.576 g
キクカ	0.288 g	ブクリョウ	0.432 g
ジオウ	1.152 g	ボタンピ	0.432 g
サンシュユ	0.576 g	タクシャ	0.432 g
を含有しています。			

添加物として滑石、ハチミツを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。）
- (4)水分が丸剤に付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- (5)湿気などにより薬が変質することがありますので、服用後は、ビンのフタをよくしめてください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



【包装】

480丸

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることや、丸剤がくっつくことがあります。品質・効果に変わりはありません。

製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106
受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

原産国 中華人民共和国

発売元  小太郎漢方製薬株式会社
大阪市北区中津2丁目5番23号
製造販売元 八ツ目製薬株式会社
東京都江戸川区船堀2-14-14