



服用に際して、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

中国のくすり

けっ ぶ ちく お がん
血府逐瘀丸

第2類医薬品

(生薬製剤)

本剤は、中国清代に著された《医林改錯》に記載されている「血府逐瘀湯」の処方に基づくものです。中年以降または高血圧傾向の方の頭痛、頭重、肩こり、のぼせ、動悸の改善に効果があります。

⚠ 使用上の注意



■ 相談すること

- 次の人は、服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消 化 器	食欲不振、胃部圧迫感
そ の 他	異常出血

- 1ヵ月間服用しても症状がよくなる場合

- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。

軟便、下痢

■ 効能・効果

中年以降又は高血圧傾向のあるものの次の諸症：
頭痛、頭重、肩こり、のぼせ、動悸

■ 用法・用量

次の量を、1日3回水又は白湯で服用して下さい。

年 齢	1回の服用量	1日の服用回数
成人(15歳以上)	8丸	3回
15歳未満	服用しないで下さい。	

● 服用に際しての注意

- 定められた用法・用量を厳守して下さい。
- 本剤は15歳未満の小児に服用させないで下さい。

※裏面もお読み下さい。

■成分・分量

成人（15歳以上）1日の服用量24丸中、次の成分を含んでいます。

血府逐瘀丸料エキス末 3.0g

成 分	含有量	成 分	含有量
ト ウ キ	1.98 g	シャクヤク	1.32 g
センキュウ	0.99 g	サ イ コ	0.66 g
ジ オ ウ	1.98 g	カンゾウ	0.66 g
トウニン	2.64 g	キキョウ	0.99 g
コ ウ カ	1.98 g	ゴ シ ツ	1.98 g
キ ジ ツ	1.32 g		

血府逐瘀湯末 1.5g

成 分	含有量	成 分	含有量
ト ウ キ	0.18 g	シャクヤク	0.12 g
センキュウ	0.09 g	サ イ コ	0.06 g
ジ オ ウ	0.18 g	カンゾウ	0.06 g
トウニン	0.24 g	キキョウ	0.09 g
コ ウ カ	0.18 g	ゴ シ ツ	0.18 g
キ ジ ツ	0.12 g		

添加物として、トウモロコシデンプン、タルク、カルナウバロウを含有します。

■成分に関連する注意

本剤は天然物（生薬）を用いていますので、丸薬の色や味が多少異なることや、丸薬がくっつくことがあります。

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 小児の手のとどかない所に保管して下さい。
- (2) 直射日光をさけ、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないで下さい。
- (4) この文書は、本剤を服用の際に必要な注意事項等が記載されていますので、箱に入れて保管して下さい。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

◎お問合せ先

イスクラ産業株式会社 お客様相談室
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-14-2
電 話：03-3281-3363
受付時間：午前9:00から午後5:00まで
（土、日、祝日を除く）

発 売 元

イスクラ産業株式会社
東京都中央区日本橋1-14-2

製造販売元

ハツ目製薬株式会社
〒134-0091 東京都江戸川区船堀2-14-14