

*2011年10月改訂
(記載要領に伴う改訂)

第2類医薬品

御使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるように大切に保管して下さい。

漢方製剤

こ ぎく みょう けん か りゅう 杞 菊 妙 見 顆 粒[®]

ハッ目製薬株式会社

本剤は、中国清代に著された《医級》に記載されている「杞菊地黄丸」の処方に基づくもので、六味地黄丸に枸杞子と菊花を加えたものです。体力中等度以下で、疲れやすく胃腸障害がなく、尿量減少又は多尿で、ときに手足のほてりや口渇があるのかすみ目、つかれ目、のぼせ、頭重、めまい、排尿困難、頻尿、むくみ、視力低下の改善に効果があります。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

*【効能・効果】

体力中等度以下で、疲れやすく胃腸障害がなく、尿量減少又は多尿で、ときに手足のほてりや口渇があるものの次の諸症：
かすみ目、つかれ目、のぼせ、頭重、めまい、排尿困難、頻尿、むくみ、視力低下

【用法・用量】

次の量を1回1包、1日3回、食前又は食間に水又は白湯にて服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
成 人 (15歳以上)	1包	3回
15歳未満	服用しないこと	

【成分】

成人（15歳以上）1日の服用量3包中に、下記成分及び分量より得た杞菊地黄丸料工キス末5.4gを含んでいます。

成 分	含有量	成 分	含有量
ク コ シ	1.5g	サ ン ヤ ク	3.0g
キ ク カ	1.5g	ブ ク リ ヨ ウ	2.25g
ジ オ ウ	6.0g	ボ タ ン ピ	2.25g
サ ン シ ュ ユ	3.0g	タ ク シ ャ	2.25g

添加物として、乳糖、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物(生薬)を用いていますので、顆粒の色や味が多少異なることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- （2）小児の手のとどかない所に保管して下さい。
- （3）他の容器に入れ替えないで下さい。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- （4）使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いいたします。

ハッ目製薬株式会社（お客様相談室）

電 話 （03）3680-0005

受付時間 9:00～17:00（土・日、祝日を除く）

製造販売元

ハッ目製薬株式会社

東京都江戸川区船堀 2-14-14