



(BG1) A

指定医薬部外品

【成分】

エタノール 76.9～81.4vol%、イソプロパノール 3.7vol%

【保管及び取扱い上の注意】

- 1.火気を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 2.小児の手の届かない所に保管してください。
- 3.揮発性がありますので、使用後は密栓して保管してください。
- 4.誤用の原因になったり品質が変わるおそれがありますので、他の容器に入れ替えないでください。
- 5.本品はニス溶于するので、ニスの塗ってある建具や家具等には本品が付着しないように注意してください。

【効能・効果】

手指・皮膚の洗浄・消毒

【用法・用量】

本品をそのまま手指に塗布又は脱脂綿、ガーゼ等に浸して清拭する。


〈用法・用量に関連する注意〉

- 1.定められた用法・用量を守ってください。
- 2.外用にのみ使用し、内服しないでください。
- 3.目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 4.同一部位にくり返し使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがありますので注意してください。
- 5.長期間または広範囲に使用する場合には、蒸気の吸入に注意してください。
- 6.小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

アルコール類・危険等級Ⅱ・水溶性

火気厳禁 飲用不可

外皮用消毒剤

消エタ・バリュー
SHOETA・VALUE

製造販売元

山善製薬株式会社

大阪市中央区道修町2丁目2番4号

連絡先:電話 06-6231-1821 [受付時間]:9:00～17:00(土・日・祭日を除く)



使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 1.局所刺激作用があるので、軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないでください。
- 2.次の部位には使用しないでください。
1) 損傷皮膚 2) 粘膜(口唇等) 3) 目のまわり



相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)本人または家族がアレルギー体質の人
- (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4)患部が広範囲の人
- (5)深い傷やひどいやけどの人

- 2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2)5～6日間使用しても症状がよくなる場合

製造番号

使用期限