

第②類医薬品

かぜ・せき・痛みに **新スコールA**

登録商標



金魚印

非ピリン系総合かぜぐすり
かぜのねつ・せき・痛みに

第②類
医薬品

新スコールA

奈良県橿原市川西町632-1
大和合同製薬株式会社
お問い合わせ先TEL0744-27-3325
月曜～金曜/AM9:00～PM5:00
(土、日、祝日を除く)

効能・効果

かぜの諸症状(鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和。

用法・用量

大人(15歳以上) 1回2錠 7歳以上15歳未満 1回1錠 1日3回水又は温湯にて食後なるべく30分以内に服用すること。

7歳未満は、服用しないこと。

(用法・用量に関連する注意) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量 1日量(6錠)中

アセトアミノフェン 660mg、エテンザミド 400mg、無水カフェイン 100mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 45mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg、クエン酸チベジジン 45mg、添加物:セルロース、CMC-Ca、バレイショデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、セラック、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、ソルビタン脂肪酸エステル、アラビアゴム、デキストリン、寒梅粉、トウモロコシデンプン、炭酸Ca、タルク、酸化チタン、白糖、ゼラチン、サランミツロウ、カルナウバロウ、黄色4号(タートラジン)を含有する

12錠入 2日分

かぜに新スコールA

第②類医薬品



2014.9改訂(記載要領変更に伴う改訂)

総合かぜぐすり

14.09

※**してはいけないこと**

△**使用上の注意**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。(3) 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、薬物酔い薬、アレルギー用薬等) 3. 服用後乗物又は機械類の運転操作をしないこと(眠気等があらわれることがある)。
4. 服用前後は飲酒しないこと 5. 長期連用しないこと

■**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 授乳中の人。(4) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)。(5) 高齢者。(6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(7) 次の症状のある人。高熱、排尿困難(8) 次の診断を受けた人。甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 皮膚:発疹・発赤、かゆみ/消化器:吐き気・嘔吐、食欲不振/精神神経系:めまい/泌尿器:排尿困難/その他:過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状	症状の名称	症 状
シ ョ ッ ク (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。	ぜ ん そ く	息をするときぜーぜー、ヒューヒューと喘る、息苦しい等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステvenson氏症候群)	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。	再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくとする、血尿等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。	無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
腎 障 害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。	間質性肺炎	関節を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空咳、発熱等があらわれ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 口のかわき、眠気 4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

¥600+税

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



あける
↑

第②類医薬品

かぜに新スコールA

保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 配置期限を過ぎた製品は服用しないこと。

配置期限