


中央クールル

(用法・用量)

15才以上 1日3回、食後、または就寝前
11才以上 1日2回、食後、または就寝前
3才以上 1日2回、食後、または就寝前

(効能・効果)



食欲不振(食慾減退)、胃腸・
胆膵器活能、消化不良、胃痛、
食べすぎ、飲みすぎ、胸やけ、
ふたれ(胃もたれ)、胸つかえ、
腹膨れ(むかつき)、胃のむかつき、
胃の日陰、胆膵のむかつき、
嘔吐、下痢

(用法・分量) (注意)

本剤は、胃腸・胆膵器の機能を高め、
消化を促進し、胃痛、胸やけ、
食べすぎ、飲みすぎ、胸つかえ、
胃もたれ、胸膨れ、胃のむかつき、
胆膵のむかつき、嘔吐、下痢を
治すのに効果的である。

赤玉中央クールル丸 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
医師の治療を受けている人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合
3. 服用に際して、次のことに注意して下さい。
(1) 定められた用法、用量を厳守して下さい。
(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
(3) 本剤は、3才未満の乳幼児に服用させないで下さい。なお、3才以上であっても幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、注意して下さい。

保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。