

はら薬中央 ツヨーゲン

効能・効果

飲みすぎ(過飲)、胃痛、食べすぎ(過食)、食欲不振(食欲減退)、消化不良、消化促進、胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくひ)、はきけ(むかつき)、胃のむかつき、二日酔、悪酔のむかつき、嘔気、悪心、嘔吐、胃部・腹部膨満感、胃弱、消化不良による胃部・腹部膨満感。

用法・用量

15才以上……………1回1包
11才以上15才未満 1回½包
8才~11才は……………1回¼包
5才~8才は……………1回¼包
3才~5才は……………1回¼包
1日3回食後に水または温湯で服用。

(1包1.22g)

20包入 ¥1,000.



総合胃腸薬



製造発売元 大和中央製薬株式会社
樹原市北八木町1丁目6-16号
0744-22-2043

はら薬中央 ツヨーゲン

成分・分量

1日量(3包)中

オウレン末……………285mg
カンゾウ末……………265.5mg
ショウキョウ末……………54mg
ケイヒ末……………186.5mg
チョウジ末……………22.5mg
ウイキョウ末……………45mg
ロートエキス散……………300mg
ジアスターゼ……………450mg
炭酸水素ナトリウム……………875mg
沈降炭酸カルシウム……………450mg
ノイシリン……………900mg
添加物：サンショウ末、サクロ
フィール末、L-メントール、
バレिशヨデンブ

注 意

1. 次の人は服用しないこと。
透析治療を受けている人
2. 服用に際しては、説明文書をよく読むこと。
3. 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。

はら薬中央ツヨーゲンの使用上の注意

してはいけないこと

- (知らないで現在の症状が悪化したり、副作用が起きやすくなる)
1. 次の人は服用しないこと 透析療法を受けている人
 2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
胃腸鎮痛鎮痙薬
 3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがある)
 4. 長期連用しないこと

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 高齢者
(4) 本人又は家族がアレルギー体質の人
(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(6) 次の症状のある人 排尿困難
(7) 次の診断を受けた人 心臓病、緑内障、腎臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合
(2) 2週間間服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
口のかわき、便秘、下痢

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

その他の注意

母乳が出にくくなることもある

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと