

■ YAMAMOTO KANPOH

日本薬局方 **カンゾウ**

第3類医薬品

- (販売名) カンゾウ ヤマト
(成分及び分量) 1日量(3g)中 日本薬局方 カンゾウ 3g
(用法及び用量) 大人(15才以上)は、1日量3gを、水約600mlをもって煮て、約400mlに煮つめ、滓を取り去り、食前又は食間3回に分服する。
(効能又は効果) 激しい咳、咽喉痛の緩解。

<使用上の注意>

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
(1) 血圧の高い人又は高齢者 (2) 心臓又は腎臓に障害のある人 (3) むくみのある人
(4) 医師の治療を受けている人 (5) 妊婦又は妊娠しているとおもわれる婦人
- 服用に際して、次のことに注意すること。
(1) 定められた用法、用量を厳守して下さい。
- 服用中又は服用後は、次のことに注意してください。
(1) 本剤を服用することにより、尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等の症状があらわれた場合には服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。まれに上記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。(2) 数日間、服用しても症状の改善がみられない場合は服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。(3) 長期連用しないこと。
(4) 短期間の服用にとどめ、連用は避けること。(4) 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること。
- 保管及び取り扱い上の注意
(1) 小児の手の届かない所に保管してください。
(2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。

副作用被害救済制度 0120-149-931

商 品 名 日本薬局方 カンゾウ

内 容 量 250 g

L O T 20050144

保存方法 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しいところに保管して下さい。

製 造
販売元

① 山本漢方製薬株式会社
愛知県小牧市多気東町156番地

YAMAMOTO KANPOH

日本薬局方 **カンゾウ** 第3類医薬品

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 短期間の服用にとどめ、連用しないでください。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3) 高齢者。
 (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。 (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 (6) 次の症状のある人。 むくみ (7) 次の診断を受けた人。 心臓病、高血圧、腎臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文をもって医師又は薬剤師に相談してください。
 (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、 まぶたが重くなる、手がこわばる、 血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください。

副作用被害救済制度 0120-149-931

商 品 名 日本薬局方 カンゾウ

内 容 量 500 g

L O T 01001044

保存方法 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない
涼しいところに保管して下さい。

製 造
販売元

① 山本漢方製薬株式会社
愛知県小牧市多気東町156番地