

YAMAMOTO KANPOH

日本薬局方 **カンゾウ** 第2類医薬品

<販売名> カンゾウ ヤマモト

<使用上の注意>

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
長期連用しないこと。

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

医師の治療を受けている人。高齢者。

次の症状のある人。むくみ

次の診断を受けた人。腎臓病、高血圧、心臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診察を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

副作用被害救済制度 0120-149-931

商 品 名 日本薬局方 カンゾウ

内 容 量 500 g

L O T D0601044

保存方法 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しいところに保管して下さい。

製 造 販売元  山本漢方製薬株式会社
愛知県小牧市多気東町156番地

日本薬局方 **カンゾウ** 第2類医薬品

<効能又は効果>

激しい咳、咽喉痛の緩解

<用法及び用量>

大人（15歳以上）は、1日量3gを、水約600mlをもって煮て、約400mlに煮つめ、滓を取り去り、食前又は食間3回に分服する。

〔注意〕定められた用法及び用量を厳守してください。

<成分及び分量>

1日量3g中 日本薬局方 カンゾウ 3g

<保管及び取扱い上の注意>

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。

(2) 小児の手の届かない所に保管すること。

(3) 他の容器に入れ替えないこと。