

胃弱、胃のむかつき

日本薬局方

せんぶり末

「良薬は口に苦し」 苦味健胃薬です。

効能又は効果

胃弱、食欲不振、
胃部・腹部膨満感、
消化不良、
食べ過ぎ、
飲み過ぎ、
胃のむかつき。



美しい白色の
かわいい
せんぶりの花です。

第3類医薬品

山本漢方製薬

日本薬局方

センブリ末

販売名 山本漢方センブリ末

【特徴】

苦味健胃薬として、昔から服用されています。

△ 使用上の注意

■ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 1ヵ月位(食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつきに服用する場合は5～6回)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

お客様相談窓口

山本漢方製薬株式会社

〒485-0035 愛知県小牧市多気東町156番地

電 話 0568-73-3131

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日は除く)

<https://www.kanpo-yamamoto.com>

副作用被害救済制度 ☎ 0120(149)931

製造販売元

① 山本漢方製薬株式会社

愛知県小牧市多気東町156番地

あけくち

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

効能又は効果

(健胃の目的で用いる場合)

胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき

(止瀉の目的で用いる場合)

下痢、消化不良による下痢、くだり腹、軟便

用法及び用量

(健胃の目的で用いる場合)

大人(15歳以上)は1回量0.015gを、1日3回食前または食間に服用する。

(止瀉の目的で用いる場合)

大人(15歳以上)は1回量0.3gを、1日3回を限度として服用する。服用間隔は4時間以上おくこと。添付のサジ1杯が、約0.4gです。

(注意)

定められた用法及び用量を厳守してください。

成分及び分量

	1日量	成 分	分 量
健胃の目的	0.045g	日本薬局方	0.045g
止瀉の目的	0.9g	センブリ末	0.9g

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【その他】

- 本剤は天然物を原料としているため、色調、味、香り等に多少の差異がでることがありますが、効果には変わりありません。
- 苦味が強く感じられる方は、オブラートに包んでお飲みになられてもかまいません。

【保存上の注意】

虫害や吸湿を防ぐため、開封後はチャックの口をキッチリ閉めてください。

万一品質に不都合な点がありましたら、お求めの店名をお書き添えの上、現品(化粧箱共)を「〒485-0035 愛知県小牧市多気東町156番地 山本漢方製薬(株) お客様相談窓口」にお送りください。代品と送料をお送りします。