

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

**鎮痛消炎プラスター剤
新パスタイム[®] W**

第3類医薬品

新パスタイムWはすぐれた鎮痛消炎作用のある、ニオイをおさえた微香性プラスター剤です。

△【使用上の注意】

☒ してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります〕

1. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口

☒ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 心	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】 肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、捻挫、関節痛、骨折痛、しもやけ

【用法・用量】 1日数回患部に貼付してください。

用法・用量に関する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) はった患部をコタツや電気毛布などで温めないでください。
- (3) 強い刺激を感じることがあるので、入浴の30分以上前にはがしてください。
また、入浴後にはる場合は30分位してからはってください。
- (4) 汗などをよくふき取り、患部をきれいにしてから使用してください。
- (5) 皮ふの弱い人は、同じところに続けてはらないでください。

【成分・分量】 高体 100g 中

サリチル酸グリコール	4.3g
メントール	6.1g
トコフェロール酢酸エステル（ビタミンE）	4.3g
ノニル酸ワニリルアミド	0.012g

添加物としてBHT、生ゴム、水素添加ロジングリセリンエステル、スチレン・イソプレン・スチレンプロック共重合体、ポリブテン、その他2成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手のとどかない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）
4. 開封後は袋の口を折りまげて保管し、早めに使用してください。
5. 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

【包 装】 5.5cm×7.2cm 40枚（10枚/袋×4袋）、70枚（10枚/袋×7袋）

発 売 元 N I D 日本ドラッグチェーン

製造販売元 **祐徳薬品工業株式会社**

佐賀県鹿島市大字納富分 2596番地1

日本製 [お客様相談窓口] TEL.0954-63-1320

受付時間 9:00~17:00 (土,日,祝日は除く)

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/>

☎ 0120-149-931