

表面の矢印から開封してください。(裏面から切ると段差がつきません。)

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

チェック 開封後はチェックを合わせ、密閉保存してください。

経皮鎮痛
消炎剤

パスタйм[®]LX8.1プレミアム大判

第2類医薬品

品番：P8PW7

包装 10cm×14cm 7枚入

▲ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります〕

1. 次の人は使用しないでください。

(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを起こしたことがある人(3) 15歳未満の小児

2. 次の部位には使用しないでください。

(1) 目の周囲、粘膜等(2) 湿疹、かぶれ、傷口(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部

3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください。

4. 連続して2週間以上使用しないでください。(本剤は痛みを一時的におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診療を受けてください)

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の診療を受けている人(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人(4) 高齢者(5) 次の診断を受けた人
気管支ぜんそく

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、青あざができる、色素沈着
消化器	胃部不快感、みぞおちの痛み
その他	むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 使用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 下痢・軟便

4. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(他の疾患の可能性もあります)

効能・効果

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量

表面のライナー(フィルム)をはがし、1日1回患部に貼付してください。

<用法・用量に関連する注意>

(1) 用法・用量を厳守してください。(2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。(3) 1日あたり2枚を超えて使用しないでください。(4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。(5) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

成分・分量 膏体100g中 [1枚あたり(10cm×14cm) 膏体量 1.4g]

ロキソプロフェナトリウム水和物…8.10g(無水物として7.14g)

l-メントール……………3.50g

トコフェロール酢酸エステル……………2.30g

グリチルレチン酸……………0.10g

添加物: スチレン-イソブレン-スチレンブロック共重合体、ポリイソブチレン、脂環族飽和炭化水素樹脂、水素添加ロジングリセリンエステル、流動パラフィン、ジブチルヒドロキシルエーテル、その他3成分

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)(4) 品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、袋をきちんと閉めて保管してください。(5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、アルミ袋を開封した後は、なるべく早く使用してください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造番号

使用期限



パスタймブランド
サイトはこちら

日本製



製造販売元



祐徳薬品工業株式会社

佐賀県鹿島市大字納富分2596番地1
【お客様相談窓口】 TEL.0954-63-1320
受付時間9:00～17:00(土、日、祝日を除く)



4 987235 024499