

切り口 → → → 矢印の方向に引くと、手で簡単に切れます。 → → →

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときにすぐ読めるように大切に保管してください。

チャック 開封後はチャックを合わせ、密閉保存してください。

第2類医薬品

経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤 販売名: Hisamitsu® ロキソプロフェンNaテープ EX

包装 7枚(7cm×10cm)

△ 使用上の注意

× してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを起こしたことがある人 (3) 15歳未満の小児

2. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口 (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部

3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください。

4. 連続して2週間以上使用しないでください。(本剤は痛みを一時的におさめるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診療を受けてください。)

👤 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (4) 高齢者 (5) 次の診断を受けた人 気管支ぜんそく

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、青あざができる、色素沈着
消化器	胃部不快感、みぞおちの痛み
その他	むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しい、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 使用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 下痢・軟便

4. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(他の疾患の可能性もあります。)

※画像は原寸大

製造番号

使用期限



↑
詳しい情報は
こちらへ

効能・効果

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手指の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量

表面のライナー(フィルム)をはがし、1日1回患部に貼付してください。

《用法・用量に関連する注意》

- (1) 用法・用量を厳守してください。(2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。(3) 1日あたり4枚を超えて使用しないでください。(4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。(5) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目立たず約半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

成分・分量 高体100g中1枚あたり(7cm×10cm)高体量0.7g]

ロキソプロフェンナトリウム水和物	8.10g(無水物として7.14g)
4-メントール	3.50g
トコフェロール酢酸エステル	2.30g
(キトサンE誘導体)	
グリチルリチン酸	0.10g

添加物: スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、ポリイソブレン、脂環族炭化水素樹脂、水素添加ジグリセリルセリステル、流動パラフィン、ジブチルヒドロキシトラン、その他3成分

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4) 品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、袋のチャックをきちんと閉めて保管してください。(5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、アルミ袋を開封した後は、なるべく早く使用してください。

発売元 **久光製薬株式会社**

〒841-0017 鳥栖市田代町408番地
<https://www.hisamitsu.co.jp>

製 造 販売元 **祐徳薬品工業株式会社**

〒849-1393 佐賀県鹿島市大字町富分2596番地1

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

久光製薬お客様相談室: TEL.0120-133250

受付時間/9:00~17:50(土日・祝日・会社休日を除く)

副用被害救済制度 ☎0120-149-931



4 987188 116043



1FD07T