

第2類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また必要なときに読めるように、大切に保管してください。

トキワ

皮膚疾患治療薬

コチゾン雪の元S

本剤は皮膚の炎症とかゆみをおさえる副腎皮質ホルモン剤ヒドロコルチゾン酢酸エステルと、抗ヒスタミン剤を配合しておりますので、かゆみがひどく、炎症を伴うしっしん、ただれなどの皮膚病に効果的です。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと

水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部。

相談すること



1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 患部が広範囲の人。
- (5) 湿潤やただれのひどい人。
- (6) 深い傷やひどいやけどの人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮 ふ (患部)	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、 持続的な刺激感

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

《効能又は効果》

アレルギー性皮膚炎、疱疹状皮膚炎、ただれ、あかぎれ、かゆみ止め、くさ、しっしん、痔疾、肛門瘙癢症、虫さされ、しもやけ、ひび、やけど、凍傷、皮膚瘙癢症、あせも

《用法及び用量》

1日2～3回患部に適当量を塗擦してください。

あるいは症状に応じガーゼに延ばして患部に貼付してください。

《用法及び用量に関連する注意》

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用し、内服しないでください。

《成分及び分量》 本品100g中

ヒドロコルチゾン酢酸エステル……………0.0016g
ジフェニヒドラミン……………0.5g
酸化亜鉛……………8.73g
添加物として、dl-カンフル、d-ボルネオール、バレイショデ
ン、ワセリン、パラフィン含有します。

《保管及び取扱い上の注意》

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用すること。
- (5) 薬が硬くて出にくい場合には手で握るなど、チューブを温めてからご使用ください。

お問い合わせは
常盤薬品工業株式会社
お客さま相談室 ☎ 0120-875-710まで
受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)
www.kusuribako.jp

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎ 0120-149-931

発売元 **常盤薬品工業株式会社**
大阪市中央区安土町3-5-12
NOEVIR GROUP
常盤薬品はノエビアグループです。

製造販売元 株式会社 **雪の元 本店**
奈良県橿原市大谷町182番地

YKMH801