

2003-01

医薬品

鎮痛・消炎剤

サリترونH

業務用

480g


 ボトル:PE  
 キャップ:PP  
 中栓:PE  
 フィルム:VC


## 【使用上の注意】



## してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

- ①目の周囲、粘膜等。
- ②湿疹、かぶれ、傷口。



## 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
  - ①本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - ②薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること

①使用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状             |
|------|-----------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み |

②5～6日間位使用しても、症状がよくなる場合

## 【効能・効果】

捻挫、打撲、筋肉痛、骨折痛、関節痛、腰痛、肩こり、筋肉疲労、しもやけ。

## 【用法・用量】

1日2～3回適量を患部に塗布する。

## 【用法・用量に関連する注意】

- ①定められた用法・用量を守ってください。
- ②目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- ③小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- ④外用にのみ使用し、内服しないでください。

## 【成分・分量】(100g中)

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| l-メントール……………5.0g | サリチル酸メチル………6.0g |
| dl-カンフル……………3.0g | ジフェンヒドラミン…0.5g  |
| 酢酸トコフェロール…0.5g   | トウガラシエキス………0.1g |
| (原生薬5gに相当)       |                 |

※添加物として、流動パラフィン、プロピレングリコール、セタノール、サラシミツロウ、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ステアリン酸グリセリン、自己乳化型ステアリン酸グリセリン、パラフィン、ステアリン酸ポリオキシル、ジメチルポリシロキサン、ユーカリ油、キサンタンガム、パラベンを含有する。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- ①直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- ②小児の手の届かない所に保管してください。
- ③他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります)

製造元 株式会社 雪の元 本店

奈良県橿原市大谷町182番地 TEL0744-22-2440 Lot.