

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

花粉、ハウスダスト等による  
鼻のアレルギー症状（鼻水、鼻づまり）に

第2類医薬品

# モーテンAG点鼻薬

アレルギー専用点鼻薬/クールタイプ

- 抗アレルギー剤「クロモグリク酸ナトリウム」を配合した「アレルギー専用」点鼻薬です。
- クロモグリク酸ナトリウム（抗アレルギー剤）が細胞膜を安定化し、鼻水、鼻づまり等のアレルギー症状を引き起こす誘発物質（ヒスタミン等）の放出を抑制します。  
また、クロルフェニラミンマレイン酸塩（抗ヒスタミン剤）がヒスタミンをブロックし、すでに起きてしまった症状を緩和します。さらに、ナファゾリン塩酸塩（血管収縮剤）が鼻づまり等を緩和します。
- 花粉、ハウスダスト等による鼻水、鼻づまり、くしゃみといったアレルギーによる不快症状に効果を発揮します。



## 使用上の注意

### してはいけないこと



（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 使用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください（眠気があらわれることがあります。）
2. 長期連用しないでください

### 相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人。
  - (3) 妊婦または妊娠していると思われる人。
  - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (5) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障
  - (6) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

| 関係部位  | 症 状          |
|-------|--------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |
| 鼻     | 刺激感、鼻出血、はれ   |
| 精神神経系 | 頭痛           |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称       | 症 状                                            |
|-------------|------------------------------------------------|
| アナフィラキシー様症状 | 使用後すぐに息苦しさ、浮腫（咽喉、まぶた、鼻粘膜、口唇等）、じんましん等の症状があらわれる。 |

3. 3日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
4. 症状の改善がみられても2週間を超えて使用する場合は、医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

## 《効能・効果》

花粉、ハウスダスト（室内塵）等による次のような鼻のアレルギー症状の緩和：鼻づまり、鼻水（鼻汁過多）、くしゃみ、頭重（頭が重い）


## 《用法・用量》

次の量を、両鼻腔内に噴霧してください。

| 年 齢       | 1回使用量 | 1日使用回数           |
|-----------|-------|------------------|
| 成人（15歳以上） | 1噴霧ずつ | 3～5回             |
| 7歳～15歳未満  |       | （3時間以上の間隔をあけること） |
| 7歳未満      |       |                  |

3日間使用しても症状の改善がみられない場合には、使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。

## 使用方法



① キャップをとりず。



② 容器をもち、液が噴霧するまで、はね部を2～3回押ししてください。



③ 静かに息を吸い込みながら、鼻腔内に噴霧してください。

〔液が残っている音はするが出ない時〕

液を吸い上げるチューブは右図のような構造になっています。緩やかなカーブがついているので容器をかたむけずお使い頂くと、むだなくお使いいただけます。



容器断面図

- \* 容器を横にして使用すると、薬液が霧状になりませんので、必ず上向きにして使用してください。
- \* 使用後は先端部分を清潔なティッシュペーパー等でふきとり、キャップをしてください。
- \* ノズルの先端を針等で突くのは折れた時大変危険ですのでおやめください。

## 《用法・用量に関連する注意》

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 点鼻用にはのみ使用してください。

## 《成分・分量》

| 成 分             | 分量(100mL)中 | 作 用                                                    |
|-----------------|------------|--------------------------------------------------------|
| クロモグリク酸ナトリウム    | 1.0g       | アレルギーをひきおこす化学物質の放出を抑えることにより、花粉やハウスダストなどによる不快な症状を緩和します。 |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 0.25g      | 抗ヒスタミン作用により、鼻水の分泌過多を抑えます。                              |
| ナファソリン塩酸塩       | 0.025g     | 鼻粘膜の血管を収縮させ、はれ、充血を抑えて、鼻づまりを改善します。                      |

添加物として、エデト酸Na水和物、ベンザルコニウム塩化物、等張化剤、グリセリン、エタノール、pH調節剤、香料を含有します。

## 《保管及び取扱い上の注意》

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早くご使用ください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までご連絡ください。

株式会社 雪の元本店 お客様相談室  
〒634-0815 奈良県橿原市大谷町182番地  
TEL 0744-22-2440 FAX 0744-22-2406

受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00  
(土曜、日曜、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)