

1日1回型 みずむし・たむし治療外用薬

アフタイト水虫クリーム

第2類医薬品

製品の特徴

みずむしやたむしは「白癬菌」というカビの1種が原因でおこります。強い痒みを伴い、薬剤が浸透しにくい場所に根付くため根絶することが困難となり再発しやすい皮膚病です。本剤は白癬菌などに対し持続的に殺菌効果を示すビホナゾールを配合しているため、1日1回の塗布により効果があらわれます。また、これに加えた4つの成分により我慢できないかゆみを抑えることができます。

サラッとした塗り心地でべたつきの少ない親水性基剤を採用しております。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1)目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、陰等）、陰のう、外陰部等。
- (2)湿疹。
- (3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)乳幼児。
- (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4)患部が顔面又は広範囲の人。
- (5)患部が化膿している人。
- (6)「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、乾燥感、ヒリヒリ感

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

【用法·用量】

患部を清潔にして、1日1回適量を患部に塗布してください。

(用法・用量に関連する注意)

- (1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)外用にのみ使用してください。
- (5)定められた用法、用量を厳守してください。

【成分・分量】 1g 中

成分名	分量	作用等
ピホナゾール	10mg	1日1回で、みずむし菌を殺します。
リドカイン	20mg	かゆみ、痛みを即座に抑えます。
クロタミトン	50mg	かゆみを持続的に抑えます。
グリチルレチン酸	5mg	炎症を抑えます。
l-メントール	20mg	スッキリした清涼感で、かゆみを軽減します。

添加物として1,3-ブチレングリコール、マクロゴール1500、流動パラフィン、自己乳化型モノステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、セタノール、カルボキシビニルポリマー、エドト酸Na水和物、ジメチルポリシロキサン、キサンタンガム、メチルパラベン、ブチルパラベンを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
- (4)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。



みずむし治療のポイント

1. 清潔 患部も衣類（靴下）もこまめに洗い清潔に。
2. 乾燥 靴を脱ぐ、靴下も脱ぐ、風通しよく、よく乾燥。
3. 根気 風呂あがりの薬剤治療、痒くなくても1シーズン。

本剤についてのお問い合わせは、
お買い求めのお店または下記までご連絡ください。

株式会社 雪の元本店 お客様相談室
〒634-0815 奈良県橿原市大谷町182番地
TEL 0744-22-2440 FAX 0744-22-2406

受付時間 9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00
(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
☎ 0120-149-931 (フリーダイヤル)

発売元

小林薬品工業株式会社
東京都中央区日本橋箱崎町40番

製造販売元

株式会社 雪の元 本店
奈良県橿原市大谷町182番地