


この添付文書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管しておいてください。

第2類医薬品

総合感冒薬
かぜの諸症状の緩和に
カゼソフトカプセル

昔から、「かぜは万病のもと」と言われていますように、こじらせる前に少しでも早く適切な手当が必要です。「カゼソフトカプセル」は、かぜの諸症状に有効な各種原料を配合した液状のかぜ薬です。解熱効果のある動物性生薬のゴオウと共に、せきに効果のあるナンテンジツ乾燥エキスを配合しています。



⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

- 【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる】
1. 次の人は服用しないでください。
(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）
 3. 本剤の服用により眠気をもよおすことがありますので、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
 4. 服用時は飲酒しないでください。
 5. 長期連用しないでください。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人：高熱、排尿困難。
(6) 次の診断を受けた人：心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステイブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。
間質性肺炎	空せき（たんを伴わないせき）を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。

ぜ ん そ く

- (2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合。
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。 □のかわき

裏面もよく御覧ください。

〔効能又は効果〕

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

〔用法及び用量〕

次の量を食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
大人（15歳以上）	2カプセル	3 回
7歳以上15歳未満	1カプセル	
7歳未満は服用しないでください。		

〔用法及び用量に関連する注意〕

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〔成分及び分量〕 6カプセル中


成 分	分 量	は た ら き
ゴ オ ウ	5.0mg	熱を下げる。
ナンテンジツ乾燥エキス (原生薬換算量)	180.0mg (1,800mg)	せきを鎮める。
アセトアミノフェン	900.0mg	熱を下げ、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み、のどの痛みなどを抑える。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの症状を抑える。
チベピジンヒベンズ酸塩	75.0mg	せきを鎮め、たんを抑える。
ノスカピン	48.0mg	せきを鎮める。
無水カフェイン	150.0mg	頭痛を和らげる。

添加物として、中鎖脂肪酸トリグリセリド、グリセリン脂肪酸エステル、ミツロウ、ゼラチン、コハク化ゼラチン、濃グリセリン、酸化チタン、黄色5号、青色1号を含有します。

保管および取扱い上の注意

- (1)小児の手の届かない所に保管してください。
(2)直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
(4)使用期限の過ぎたものは、服用しないでください。
(5)＜カプセルの取り出し方＞

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります）尚、高温にて保管の場合、カプセルがやわらかくなり取り出しにくくなりますのでご注意ください。



消費者相談窓口

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局、薬店または下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

ユニテックメディカル株式会社

〒543-0021 大阪府大阪市天王寺区東高津町9番23号

お問合せ…☎0120-324-117

受付時間 10:00～16:00

（土曜・日曜・祝日・お盆・年末年始を除く）

製造販売元

ユニテックメディカル株式会社

奈良県高市郡高取町車木323-1