


この添付文書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管しておいてください。

第2類医薬品

総合感冒薬 かぜの諸症状の緩和に カゼソフトカプセル

昔から、「かぜは万病のもと」と言われていますように、こじらせる前に少しでも早く適切な手当が必要です。「カゼソフトカプセル」は、かぜの諸症状に有効な各種原料を配合した液状のかぜ薬です。解熱効果のある動物性生薬のゴオウと共に、せきに効果のあるナンテンジツ乾燥エキスを配合しています。



⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

1. 次の人には服用しないでください。
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気等があらわれることがあります。)
4. 服用前後は飲酒しないでください。
5. 長期連用しないでください。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 次の症状のある人：高熱、排尿困難。
 - (5) 次の診断を受けた人：心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群、 中毒性表皮壊死剥離症、 急性汎発性発疹性膿疱症)	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

裏面もよく御覧ください。

- 3.服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。口のかわき、眠気
- 4.5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔効能又は効果〕

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

〔用法及び用量〕

次の量を食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
大人（15歳以上）	2カプセル	3 回
7歳以上15歳未満	1カプセル	
7歳未満は服用しないでください。		

〔用法及び用量に関連する注意〕

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〔成分及び分量〕 6カプセル中

成 分	分 量	は た ら き
アセトアミノフェン	900.0mg	熱を下げ、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み、のどの痛みなどを抑える。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの症状を抑える。
チベピジンヒベンズ酸塩	75.0mg	せきを鎮め、たんを抑える。
ノスカピン	48.0mg	せきを鎮める。
無水カフェイン	150.0mg	頭痛を和らげる。
ナンテンジツ乾燥エキス (原生薬換算量)	180.0mg (1,800mg)	せきを鎮める。
ゴ オ ウ	5.0mg	熱を下げる。

添加物として、中鎖脂肪酸トリグリセリド、グリセリン脂肪酸エステル、ミツロウ、ゼラチン、コハク化ゼラチン、濃グリセリン、酸化チタン、黄色5号、青色1号を含有します。

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4)使用期限の過ぎたものは、服用しないでください。
- (5)＜カプセルの取り出し方＞

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります）尚、高温にて保管の場合、カプセルがやわらかくなり取り出しにくくなりますのでご注意ください。



消費者相談窓口

本剤についてのお問い合わせは、お買い求め先または下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

ユニテックメディカル株式会社

〒543-0021 大阪府大阪市天王寺区東高津町9番23号

お問合せ…0120-324-117

受付時間 10:00～16:00

（土曜・日曜・祝日・お盆・年末年始を除く）

製造販売元

ユニテックメディカル株式会社

奈良県高市郡高取町車木323-1