

第②類医薬品

サン総合感冒薬 コールドナイン



19(B)

第②類
医薬品



サン総合感冒薬

第②類医薬品

12歳 から服用
できます



つらいせき・鼻水・ねつのどの痛み
27錠

副作用・投与量・禁忌
電話: 0120-149-931

コールドナイン
cold nine

9種の成分がかぜの諸症状を和らげます

つらいせき・鼻水
ねつ・のどの痛み



27錠

使用期限

コールドナイン
サン総合感冒薬

PC-A012A

1

製造販売者 有限会社 サン・ショウ
青森県青森市大字横内字若草13番地6

お客様相談室 ☎ 017-728-0110
受付時間: 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)



- 注意
1. 次の人には服用しないでください。
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用中の人
 2. 服用後、薬物又は機械類の運転操作をしないください。
(3) 12歳未満の小児
 3. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
 4. 服用が適さない場合がありますので、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 5. 服用に際しては、説明書をよく読んでください。
 6. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

第②類医薬品

サン総合感冒薬 コールドナイン

効能・効果
かぜの諸症状(鼻水・鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量
次の量を、食後なるべく30分以内に服用してください。

年齢	1回量	服用回数
15歳以上	3錠	1日3回
12歳~14歳	2錠	

× 服用しないでください

成分・分量(9錠中)

フェニチン・エフェドリン塩酸塩 450mg
d-ソロロロ・エフェドリン塩酸塩 750mg
d-ソロロロ・エフェドリン塩酸塩 3.5mg
シクロコキシブ・エフェドリン塩酸塩 15.4mg
d-メチル・エフェドリン塩酸塩 60mg
ノルアドレナリン塩酸塩 48mg
無水カフェイン 75mg
チアミン・塩酸塩 25mg
リボフラビン 12mg
添加物: ソロロロ・エフェドリン塩酸塩、無水カフェイン、d-ソロロロ・エフェドリン塩酸塩、ノルアドレナリン塩酸塩、シクロコキシブ・エフェドリン塩酸塩、d-メチル・エフェドリン塩酸塩、フェニチン・エフェドリン塩酸塩

押してあける

