

服用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう保管してください。

養 命 錠

養命錠は、血管を丈夫にする“ルチン”、おだやかな通じをつける“ダイオウ”、“センナ”等を配合し、高血圧による種々の症状を緩和するお薬です。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下薬（下剤）、乗物酔い薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気があらわれることがあります。)
3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
4. 服用時は飲酒しないでください。
5. 大量に服用しないでください。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5)次の症状のある人。
はげしい腹痛、悪心・嘔吐
 - (6)次の診断を受けた人。
腎臓病、甲状腺機能障害、てんかん
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、悪心・嘔吐
その他	どうき

(2)5～6日間服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。

下痢

□効能又は効果

高血圧による頭痛・手足のしびれ・耳なり・めまい・肩のこり・のぼせ。
便秘。

□用法及び用量

次の量を、朝夕各食後服用してください。

年齢	1 回量	1 日服用回数
大人(15才以上)	4 錠	2 回
15才未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守してください。

□成分及び分量（8 錠 1 日量 1.52 g 中）

ルチン	80mg	枸杞子	200mg
硝酸チアミン	4mg	ダイオウ末	275mg
アスコルビン酸	30mg	センナ末	110mg
グルクロン酸	40mg	ケイヒ末	100mg
ジプロフィリン	200mg	ブロムワレリル尿素	120mg
添加物として、リン酸水素カルシウム、アラビアゴム、ステアリン酸マグネシウム及びセラックを含有します。			

□保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

〈お問い合わせ先〉

本剤のご使用により、何かお気付きの点がございましたら、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

養命製薬株式会社「お客様相談窓口」

電話 0766-53-1226

受付時間 9：00～16：00（土・日・祝日を除く）



製造元 養命製薬株式会社



〒939-0418 富山県射水郡大門町布目沢622-6

富山営業所 〒930-0853 富山市永楽町7-10

電話 076-432-6778