

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

桂枝湯乾燥エキス配合

非ピリン系・かぜ薬 ドレークS顆粒

ドレークS顆粒は、かぜによる熱や痛みなどに効き目をあらわすアセトアミノフェンや無水カフェイン、漢方処方『桂枝湯』の乾燥エキスを配合した分包顆粒剤（1包1.2g）です。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください
 - (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気があらわれることがあります。)
4. 服用時は飲酒しないでください
5. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2)妊娠又は妊娠していると思われる人。
- (3)授乳中の人は。
- (4)高齢者。
- (5)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (6)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (7)次の症状のある人。

高熱、排尿困難

- (8)次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	恶心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、むくみ、胸苦しさ等とともに顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステーキンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。

症状の名称	症 状
間質性肺炎 ぜんそく	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあります。)、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに医師の診療を受けること。)

(2) 5~6回服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
便秘、口のかわき

■ 効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

■ 用法・用量

次の用量を1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1回服用量
成 人 (15才以上)	1 包
11才以上15才未満	2/3 包
7才以上11才未満	1/2 包
3才以上7才未満	1/3 包
3才未満の乳幼児	服用しないこと

(用法・用量に関する注意)

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■ 成分とはたらき

淡かっ色の顆粒剤で、3包（成人の1日服用量）中に次の成分を含有しています。

成 分	分量(3包中)	はたらき
アセトアミノフェン	900mg	熱を下げる、痛みをおさえます。
マレイン酸クロルフェニラミン	7.5mg	くしゃみ、鼻水をおさえます。
リン酸ジヒドロコデイン	15mg	せきをしづめます。
dL-塩酸メチルエフェドリン	30mg	せきをしづめます。
無水カフェイン	120mg	頭痛をやわらげます。
桂枝湯乾燥エキス	370mg	かぜによる頭痛、発熱、悪寒(さむけ)などに効果をあらわします。

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、無水ケイ酸、セルロース、乳糖、パレイショデンプン、香料を含有しています。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
(4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、品質保持の点から2日以内に服用してください。
(5) 期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

お客様相談室 電話0256(93)3171(代表) 受付時間:9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

 吉田药品工業株式会社

新潟県燕市吉田東栄町8番11号